MINI-GUÍA DE CAMPO DE LAS AVES COMUNES DEL PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MONTERREY

PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MONTERREY
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

MINI-GUÍA DE CAMPO DE LAS AVES COMUNES DEL PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MONTERREY

Parque Nacional Cumbres de Monterrey,
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas,

Alan Monroy Ojeda y Elsa Leticia Esquer Ovalle.

Ilustraciones y mapas:
Ing. Alan Monroy Ojeda
Biol. Jesús Oliver Castillo Hernández

Diseño:
Alejandra Rios

Monterrey, Nuevo León, México 2011

CONTENIDO

	Página
-Prologo	1
-Agradecimientos	2
-Índice de especies	3
-Introducción	5
Mapa del Parque Nacional Cumbres de Monterrey	7
-La identificación de aves	9
Topografía de las aves	13
-Como usar la guía	14
-Láminas de las aves	15
-Glosario	75
-Bibliografía	79
- Formato de registro de avistamientos	80

PRÓLOGO

Pendiente

AGRADECIMIENTOS

Sin el apoyo de diferentes personas e instituciones no hubiera sido posible realizar esta pequeña contribución para el conocimiento de las aves del Parque Nacional Cumbres de Monterrey (PNCM), a todos nuestra sincera gratitud.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a través de MVZ Fernando Seriña Garza y el Biol. Sadot Edgardo Ortiz Hernández, director y subdirector del PNCM respectivamente, fue determinante para la cristalización de este documento. De la misma manera, Alejandra Ríos colaboró desinteresadamente en la elaboración de la guía.

A (pendiente)

A la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Nuevo León quien facilitó la realización de esta guía.

A Santiago Gibert por su apoyo desinteresado en la digitalización del material ilustrativo, a Manuel Grosselet por sus revisiones y crítica constructiva de los dibujos. A nuestros seres queridos, sin los cuales no tendríamos el placer de las cosas sencillas de la vida.

A todas aquellas personas que en su vida diaria contribuyen a un cambio en el paradigma del devenir humano hacia un mundo de respeto y retro-aprendizaje hacia Gaia, nuestra madre Tierra.

ÍNDICE DE ESPECIES

Nombre Común	Nombre Científico	Pàg.
Aseriformes		
Pijije ala blanca	Dendrogygna autumnails	1
Falconiformes		
Zopilote aura	Cathartes aura	2
Aguililla cola roja	Buteo jamaicensis	3
Cernícalo americano	Falco sparverius	4
Galliformes		
Chachalaca vetula	Ortalis vetula	5
Guajolote norteño	Meleagris gallipavo	6
Columbiformes		
Paloma huilota	Zenaida macroura	7
Psittaciformes		
Cotorra serrana oriental	Rhynchopsitta terrisi	8
Cuculiformes		
Correcaminos norteño	Geococcyx californianus	9
Apodiformes		
Colibri pico ancho	Cynanthus latirostirs	10
Trogoniformes		
Trogon elegante	Trogon elegans	11
Coraciformes		
Momoto corona azul	Momotus momota	12
Martin pescador de collar	Megaceryle torquata	13

Nombre Común	Nombre Científico	Página
Piciformes		
Carpintero cheje	Melanerpes aurifrons	14
Carpintero bellotero	Melanerpes formicivorus	15
Passeriformes		
Mosquero cardenal	Pyrocephalus rubinus	16
Chara pecho gris	Aphelocoma ultramarina	17
Chara verde	Cyanocorax yncas	18
Cuervo común	Corvus corax	19
Carbonero embridado	Myioborus pictus	20
Matraca del desierto	Cardinalis cardinalis	21
Reyezuelo de corona roja	Icterus graduacauda	22
Perlita azul-gris	Baeolophus wollweberi	23
Centzontle norteño	Campylorhynchus brunneicapillus	24
Cuitlacoche pico curvo	Regulus calendula	25
Chipe trepador	Polioptila caerulea	26
Chipe gorra rufa	Mimus polyglottos	27
Chipe ala blanca	Toxostoma curvirostre	28
Cardenal rojo	Mniotilta varia	29
Bolsero cabeza negra	Basileuterus rufifrons	30

INTRODUCCIÓN

El Parque Nacional Cumbres de Monterrey (PNCM) es un Área Natural Protegida con una superficie de 177,367 hectáreas, es decir, tres veces el Área Metropolitana de Monterrey. Localizado en la zona oeste-centro de Nuevo León , colinda con el Estado de Coahuila y abarca los municipios de Allende, Montemorelos, Monterrey, Rayones, San Pedro Garza García, Santa Catarina y Santiago.

Las principales tipos de vegetación en el parque se agrupan en los siguientes grandes grupos: matorrales áridos, bosque de encino, bosque de coníferas o pinos y vegetación de galería o a las orillas de los ríos.
Los ecosistemas presentes dentro del PNCM son una mezcla de elementos provenientes de áreas frías o neárticas, como los bosques de pino, así como de elementos tropicales del centro y sur del continente americano, como resultado de la variabilidad de los factores abióticos de la Sierra Madre Oriental (SMO). La sierra funciona como un "corredor biológico" en la porción oriental del país con orientación Norte-Sur permitiendo que tanto especies neotropicales como neárticas se desplacen en el área; pero cuando la sierra cambia de dirección hacia el este rumbo a Coahuila, representa un límite a la distribución de especies con afinidades tropicales o poco resistentes a las condiciones más áridas presentes al Norte del Parque.

En el PNCM se encuentran alrededor 280 especies de aves (Cotera et al., 2008) lo que representa el 66% de las reportadas para Nuevo León, o el 26% de las reportadas para México. De las aves presentes en el parque, 23 se encuentran enlistadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, bajo algún riesgo de conservación. De particular interés se pueden mencionar aves como la guacamaya enana o cotorra serrana oriental (Rhynchopsitta terrisi), especie endémica de la SMO, que habita en bosques mixtos de pino; y el loro tamaulipeco (Amazona viridigenalis), la cual es muy apreciada como ave de ornato en cautiverio y habita los bosques de galería y las faldas de las montañas en la zona del Parque. Así mismo, existen algunas aves rapáces como el halcón peregrino (Falco peregrinus) y el tecolote moteado (Strix occidentalis) consideradas como especies amenazadas en la Norma Oficial Mexicana 059.


La información existente sobre las aves del PNCM puede ser encontrada en el borrador del programa de manejo, en investigaciones realizadas por instituciones educativas, como la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como organizaciones no gubernamentales.

La presente guía tiene como finalidad mostrar una pequeña porción de las especies más frecuentes o emblemáticas del PNCM y sembrar el interés de los visitantes al parque en la belleza y diversidad de estos carismáticos organismos emplumados. Nuestra idea es que cuando el observador se acerque al fascinante mundo de las aves, se vuelva consciente de la necesidad de conservarlos, así como de la importancia que juegan las áreas naturales protegidas en la conservación de la vida.

MAPA DEL PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MONTERREY



Ubicación del PNCM en el Estado de Nuevo León



Simgología

- Agricultura de riego
- Agricultura de temporal
- Area sin vegetacion aparente
- Bosque de pino
- Bosque de encino
- Bosque de oyamel
- Bosque de tascate
- Chaparral
- Matorral desertico microfilo
- Matorral desertico rosetofilo
- Chaparral
- Pastizal
- Vegetacion de galeria
- Polígono PNCM
- Zona Urbana
- Poblados
- Carreteras
- Caminos
- Corrientes de agua

LA IDENTIFICACIÓN DE AVES

¿Dónde y cuándo observar aves?

Las aves se encuentran prácticamente en todo a tu alrededor. Cuando sales al campo, podrás darte cuenta de que las aves son más activas durante las primeras horas después del amanecer, así como antes del crepúsculo. Durante este tiempo, tendrás más oportunidades de escuchar y observar la mayor diversidad de especies. Igualmente, hay lugares donde se concentran mayormente las aves, tales como arroyos o estanques, en arbustos con frutos, así como en lugares con abundancia de flores. Los ecotonos o áreas donde hay transición entre los tipos de vegetación (p. e. entre un bosque de encino y matorral submontano) son lugares donde puedes ver un gran número de especies. Algunos lugares conocidos e ideales para la observación de aves dentro del PNCM son: La Cola de Caballo, Matacanes, La Cascada del Chipitín, Cañón de San Cristóbal, La Laguna de Sánchez, La Huasteca, etc.

Recomendaciones para la Observación de Aves.

La intención de observar aves es aprender y disfrutar de la naturaleza a través de estos animales voladores, y la mejor forma de hacerlo es mostrando respeto y no haciendo acciones que puedan molestarlas. A continuación te damos algunas recomendaciones para que tu observación de aves sea mas gratificante e ilustrativa.

a) Procura caminar de forma atenta, silenciosa y despacio. Las aves son sensibles al ruido y tienen un sentido de la vista muy agudo, por lo que te recomendamos utilizar ropa de un color que se pueda confundir con el ambiente (café, beige, verde).

b) Procura caminar a través de las veredas y senderos establecidos. No solo tendrás más posibilidades de ver más aves, sino que evitarás pisar y maltratar el hábitat de otras especies y las plantas de las cuales las aves se alimentan y usan para construir sus nidos.

c) Si encuentras un nido no lo toques, guarda tu distancia y procura alejarte. Hay algunas aves que se pueden asustar y lo abandonarán.

d) Familiarízate con las aves presentes en el parque consultando guías de identificación y libros de aves antes de salir a pajarear. De esta forma podrás identificar más rápidamente las aves cuando las veas en el campo.

e) Las personas que viven en las localidades rurales tienen un gran conocimiento de las aves locales y saben muy bien donde encontrarlas. La gran mayoría estará dispuesta a compartir sus conocimientos de forma muy atenta, detente un momento, disfruta de una plática con ellos y de aprender cosas nuevas.

f) De preferencia has tus recorridos acompañado, o en su defecto avísale a alguien la parte que planeas visitar. La seguridad tanto de tu persona como del medio son la prioridad.

Material

Observar aves o pajarear puede realizarse simplemente con la ayuda de tus ojos y tus oídos. No es necesario material muy costoso o sofisticado. Sin embargo, es altamente recomendable el uso de un par de binoculares que te permitan observar las aves desde la distancia sin perturbarlas, a la vez que puedas ver mejor los detalles de su plumaje, su morfología y su comportamiento. En el mercado existen una infinidad de modelos de diferente calidad y precio. Otro material que te será de gran utilidad es una libreta de campo donde puedas apuntar todas tus observaciones y detalles de algún ave y la localidad que hayas visitado.
Existen gran variedad de guías de campo y sin duda, este libro que tienes en las manos te será de gran ayuda para identificar algunas de las aves más comunes y emblemáticas del PNCM.

¿Cómo identificar aves?

La identificación de aves es un pasatiempo y a la vez un reto muy enriquecedor en el que debes agudizar tus sentidos y observar detenidamente los detalles de su morfología. A continuación exponemos algunas características que debes observar y que te serán de gran ayuda al tratar de identificar los pájaros que vuelan a tu alrededor.

Color

El color es una de las características más importantes a la hora de identificar un ave en campo. Muchas veces solo podrás ver un destello de colores, rayas y manchas que se mueven a través de la vegetación. Estos colores y características específicas te llevarán muchas de las veces a identificar el ave que estas observando. Procura poner mucha atención en los colores de todas las partes del cuerpo (alas, cabeza, cola, pico, patas), y si existe la presencia de rayas, manchas, puntos, etc. en el plumaje.

Morfología

Las proporciones corporales son detalles que te hablarán mucho del ave, al igual que te ayudarán a identificarla. Procura observar la forma y tamaño del pico (gancho, espátula, cónico), alas (anchas, cortas, redondeadas), patas (palmeadas, con garras, alargadas, etc.) y la composición general del cuerpo (pequeño, regordete, compacto, etc.). Trata de

establecer el tamaño del ave con alguna referencia de alrededor o con alguna ave conocida

Silueta


Dentro de las aves existe una gran variedad de grupos cuya constitución general difiere sustancialmente. Por ejemplo, la constitución de un halcón es muy diferente a la de un colibrí, al igual que la de un búho difiere bastante a la de una cotorra. Entonces, el primer paso será precisamente poder identificar a través de la silueta del ave el grupo al que pertenece.




Águila
Planeadores



Carpintero
Trepadores



Cardenal
Percheros



Pato
Nadadores


Comportamiento


Hay características del comportamiento que te permitirán identificar a un ave incluso antes de haberla visto. Por ejemplo, si ves a un ave que está avanzando verticalmente sobre un tronco, puedes intuir que es un pájaro carpintero, o si ves un ave pequeña que aletea rápidamente y se mantiene cerca de unas flores, sabrás que es un colibrí. Procura observar en que lugares ves a las aves (en las partes bajas de la vegetación o en las copas de los árboles), si son gregarios o mas bien solitarios, si aletean o mas bien planean cuando vuelan, si están en el agua o en áreas desérticas, etc.

Canto

Los cantos de las aves son igualmente una forma en la que podrás identificarlas dado que las especies producen cantos y llamados únicos (¡exceptuando a las aves imitadoras que pueden copiar los cantos de otras aves!). Mientras más salgas al campo y observes detenidamente que aves producen ciertos sonidos podrás poco a poco aprender los cantos de las aves más comunes e identificarlas con tan solo escucharlas. También puedes encontrar en venta CDs con las grabaciones de los cantos de las aves mexicanas.


TOPOGRAFÍA DE LAS AVES





COMO USAR LA GUÍA

Para la identificación de las aves, se incluye una ficha técnica por especie que describe algunas señas de campo, además que trata aspectos sobre la ecología de las especies, distribución general y en el PNCM así como información sobre su estado de conservación.



Nombre Común
English Name
Nombre Científico
Descripción del ave

El nombre científico de cada especie se obtuvo de la lista de Aves de Norteamérica (AOU 1998) y revisando los 10 suplementos que hasta la fecha han sido publicados para mantener actualizada la lista. Los nombres comúnes en español fueron obtenidos de Escalante et al. (1996) y en inglés de la misma AOU (1998).

Los dibujos de la guía representan animales adultos en la temporada de reproducción. Es posible que la coloración cambié en individuos jóvenes o en otra época del año, así como en hembras de diferente coloración de plumaje. Diferentes guías de aves más completas ilustran detalladamente las variaciones dentro la misma especie. Los autores recomiendan la guía de Howell y Webb (1995), así como la de Peterson y Chalif (2000), Sibley (2001), Garza de León (2003) y National Geographic (2006) para profundizar en el conocimiento e identificación de las aves en el PNCM.

Silueta de grupo al que pertenece



Dibujo del ave

Ubicación dentro del PNCM

Pato Pijije ala blanca

Black-bellied Whistling Duck

Dendrocygna autumnalis

Señas de campo:

Pato parecido a un ganso, sus patas son largas y rosadas, el joven las tiene negras. Es de color cobrizo con el vientre negro. Su pico es de color naranja brillante con el extremo de la punta gris. El rostro es color gris claro. En las alas cerradas se puede observar una banda blanca. Cuando vuela se puede observar claramente la banda blanca en el ala negra. La parte inferior del ala es negra. Su voz de llamado es un silbido fuerte pi-ji-ji, pi-ji-ji o pi-chi-chi

Hábitat y Hábitos:

Se le puede encontrar en arroyos, ciénegas de agua dulce, presas y ríos; también perchando en árboles cerca de los cuerpos de agua y en campos de cultivo. Es un ave gregaria que puede verse en grupos de trescientos individuos o más. Son aves muy ruidosas que vocalizan constantemente durante el vuelo. Anidan en cavidades de los árboles, ocasionalmente en el suelo.

Alimentación:

Omnívora. Su dieta consiste de plantas acuáticas, semillas, pastos, pequeños animales acuáticos, insectos, peces, moluscos y crustáceos, a menudo forrajea en campos de cultivo donde come las semillas y granos que se han esparcido después de la cosecha.

Distribución y Presencia:

Se distribuye desde el sur de Texas pasando por México y América Central llegando hasta el norte de Argentina. En México se le ve principalmente en regiones costeras bajas en el sur de Sonora, hasta Chiapas y de Tamaulipas hasta la península de Yucatán y ocasionalmente tierras adentro. En el PNCM se le puede observar durante todo el año, principalmente en invierno cerca de los cuerpos de agua.

Estado de conservación:

De acuerdo a la IUCN es una especie fuera de peligro. Sus poblaciones no están amenazadas.





Ubicación

Zopilote Aura
Turkey Vulture
Cathartes aura

Señas de campo:
Ave de talla grande con una envergadura de 1.8 m. Su cola es alargada y oscura, las alas son largas y estrechas. La parte inferior de las alas es de dos tonos; cobertoras color oscuro, y plumas de vuelo gris cenizo. Su cabeza pequeña esta libre de plumas, siendo de color rojiza en adultos y en los jóvenes es negruzca. Las auras planean, deslizándose y meciéndose suavemente por el viento. Ocasionalmente da aleteos suaves. Cuando vuela, las alas se extienden mas arriba del plano horizontal, dando la apariencia de una "V". En la distancia aparenta ser completamente negra, pero en la cercanía se puede apreciar su color castaño, en la parte superior de las alas.

Hábitat y Hábitos:
Se encuentra prácticamente en todos los ecosistemas terrestres mexicanos, desde selvas, desiertos y bosques hasta en las ciudades; desde el nivel del mar hasta la alta montaña. Durante las primeras horas del día, las auras abren sus alas de par en par para calentarse sobre su sitio de percha. Avanzado el día, esperan las corrientes termales ascendentes de aire para remontar el vuelo, y buscar alimento. Generalmente cuando un aura baja a comer, es observada por otras auras y zopilotes los cuales también bajan al festín. Al atardecer las auras sobrevuelan y perchan en árboles grandes o paredes montañosas de difícil acceso donde pasan la noche.

Alimentación:
Carnívora. Principalmente de animales muertos. Muy raramente depreda animales pequeños o crías indefensas. Las crías son alimentadas de pedazos de carne regurgitados por los padres.

Distribución y Presencia:
Desde el sur de Canadá hasta el sur de Chile y Argentina. Es residente en prácticamente todo el territorio mexicano, y puede migrar en otoño y primavera, que son aves provenientes de poblaciones mas septentrionales. Se puede observar en todos los ecosistemas presentes en el PNCM.

Estado de conservación:
Es una especie fuera de peligro, comúnmente observada en el PNCM.

Zopilote Aura





Ubicación

Aguililla Cola Roja

Red Tailed Hawk

Buteo jamaicencis

Señas de campo:

Es una rapaz fornida de alas anchas con una envergadura de 1.2 a 1.4 m. Existen diferentes razas las cuáles muestran tamaños y plumajes muy variados. Los adultos se distinguen por tener la parte superior de la cola rojiza y la parte superior de las alas café oscuro, mientras que en los jóvenes, la cola es gris oscura. La parte superior de las plumas primarias es pálida traslúcida. La garganta, pecho y vientre son de color claro pálido, mostrando una banda rayada café ligeramente marcada en el abdomen. Tiene dos manchas oscuras en el borde de la parte inferior del ala casi pegado al cuerpo. En vuelo da aleteos hondos y marcados. Cuando planea, sus alas se extienden ligeramente por arriba del plano horizontal, dando la apariencia de una ancha "U". La hembra es ligeramente mayor al macho y puede llegar a pesar hasta 1.46 Kg.

Hábitat y Hábitos:

Se le puede ver en áreas abiertas, pastizales, matorrales, bosques, montañas y desiertos. Perchando a veces en postes de luz y cercados próxima a los caminos. Es una rapaz diurna que caza principalmente mamíferos pequeños. Se mantiene en una percha esperando hasta que divisa una presa y se lanza a cazarla. También vuela a poca velocidad y cerca del suelo buscando presas. Generalmente ponen sus nidos en las copas de los árboles o riscos.

Alimentación:

Carnívora. Su dieta está basada principalmente en roedores y lagomorfos, algunos anfibios, otras aves, víboras y en ocasiones carroña.

Distribución y Presencia:

Se distribuye desde el Sur de Alaska y Canadá hasta Panamá; Es una especie residente en prácticamente todo el territorio mexicano. Durante el otoño y primavera se pueden observar aguilillas cola roja migratorias. Estas aves provienen de poblaciones que se reproducen en latitudes mas septentrionales. Se puede observar en todos los ecosistemas presentes en el PNCM.

Estado de conservación:

De acuerdo a la IUCN y la legislación mexicana sus poblaciones no están amenazadas, sólo dos subespecies en las Islas Marías y Socorro se consideran en peligro de extinción y sujetas a protección especial en México.
El Aguililla Cola Roja es común en el PNCM.





Ubicación

Cernicalo Americano

American Krestel

Falco sparverius

Señas de campo:

Es el halcón más pequeño de Norteamérica. Es una rapaz delgada con cola y alas largas. La distingue su coloración rojiza de la espalda y cola, así como el patrón de la cara. Existen diferencias de coloración y tamaño entre machos y hembras, siendo estas últimas las de mayor tamaño. El macho adulto presenta la espalda rojiza con barras negras, las alas son de color gris azulado con manchas negras, y la cola es rojiza con una banda casi al final negra y la punta blanca. La coronilla es gris azulado con una mancha central rojiza, y las mejillas son blancas, con dos barras verticales negras. Un "ocelo" negro se distingue a cada lado de la nuca. La parte inferior del cuerpo es blanca progresando a un color crema en el pecho. El costado presenta puntos negros. El cere en el pico y las patas son amarillas. La hembra presenta la espalda, cola y alas rojizas con barras negras. El pecho y vientre son blancos con listados cafés. El patrón de la cabeza es similar al del macho pero más opaco. Los jóvenes son semejantes a los adultos pero con el barrado de la parte superior y el listado de la inferior más profusos.

Hábitat y Hábitos:

Se le encuentra en campos abiertos, praderas, desiertos, arroyos arbolados, campos de cultivos, y ciudades. Es comúnmente observada perchando sobre cables de luz o manteniendo el vuelo estático sobre un mismo lugar en la búsqueda de presas. Anida en cavidades de los árboles, en riscos y ocasionalmente en edificios.

Alimentación:


Carnívora. Su dieta está compuesta principalmente por pequeños roedores e insectos. Ocasionalmente caza aves pequeñas, anfibios y reptiles.

Distribución y Presencia:

Desde el oeste de Alaska y el norte de Canadá hasta el noreste de Nicaragua, en las Bahamas y las Antillas y en Suramérica hasta la Tierra del Fuego. En México se le puede encontrar en prácticamente todo el territorio. Algunas poblaciones son residentes y otras invernales. En el PNCM es comúnmente observarla en los ecosistemas desérticos y de pradera durante el invierno.

Estado de conservación:

De acuerdo a la IUCN y la legislación mexicana es una especie fuera de peligro. Sus poblaciones no están amenazadas.





Cernicalo Americano

Chachalaca Vetula

Plain Chachalaca

Ortalis vetula

Señas de campo:
Es un ave grande con la silueta parecida a la de un guajolote juvenil, la cabeza es pequeña, su cuello y cola son largos y la garganta desnuda y de color rojo. Los adultos presentan la cabeza y el cuello gris oscuro, y el cuerpo y las alas café oliváceo opaco. Por debajo el tono es beige y progresa a ocráceo en el abdomen. La cola larga y redondeada es negruzca con lustre verde y la punta blanca pálida. El iris es café y el pico es negruzco. Las patas son de color gris apagado. Se le reconoce fácilmente por su estridente canto que asemeja el sonido de una matraca.


Hábitat y Hábitos:
Se le encuentra en bosque secos, en vegetación secundaria, y en matorrales altos. Es una especie gregaria y comúnmente se le puede ver en grupos de 4 a 20 individuos. Buscan alimento tanto en los árboles y matorrales como en el suelo, pasando la mayor parte de su tiempo sobre los árboles. Son sigilosas y precavidas, y por eso, difíciles de ver. Sin embargo, es fácil de escucharse a grandes distancias por la mañana al amanecer, lo cual hace más fácil su localización.

Alimentación:
Omnívora. Su dieta consiste en frutos, semillas, follaje, flores, ocasionalmente reptiles e insectos.

Distribución y Presencia:
Se distribuye desde el valle del Río Bravo en Texas, hasta el noroeste de Costa Rica. En México se distribuye en la vertiente del Golfo, desde el norte de Tamaulipas, parte de Nuevo León hasta el centro de Chiapas y Yucatán. Es una especie residente durante todo el año en su área de distribución. En el PNCM se distribuye en las partes semiáridas, donde hay matorral sub-montano y matorral tamaulipeco espinoso, donde es comúnmente observada durante todo el año.

Estado de conservación:
De acuerdo a la IUCN y la legislación mexicana es una especie fuera de peligro. Sus poblaciones no están amenazadas.





Ubicación

Guajolote norteño

Wild Turkey

Meleagris gallopavo

Señas de campo:

Es una de las aves terrestres más grande de Norteamérica. Tiene la cabeza desnuda azulada con verrugas rojas. Su cuerpo es negro iridiscente a veces dando la apariencia de ser color bronce verdusco. Las plumas de vuelo del ala son pálidas claras con rayas oscuras. La cola es larga color bronce. Los machos adultos tienen un grupo de plumas largas que sobresalen del pecho el cual se conoce como "peine" o barba". Las hembras raramente presentan un peine, siendo además más pequeña, menos iridiscente y con la cabeza más pequeña y menos llamativa. El cuerpo es grande y pesado, patas largas y un cuello y cabeza ligeramente pequeños en proporción con el cuerpo. El peso puede variar desde los 2.5 hasta los 10.8 Kg.

Hábitat y Hábitos:

Bosques de montañas, principalmente bosques de encino y pino. En Tamaulipas se observa cerca de las planicies costeras, en bosques de matorral espinoso. Son aves que viajan en grupos buscando comida en claros del bosque. Son sigilosas y difíciles de ver. Emite un gorgoteo o cloqueo descendente audible a más de un kilómetro de distancia haciendo que sea mas fácil escucharlo que verlo. Los machos despliegan su cola en forma de abanico y esponjan sus plumas del cuerpo dando una apariencia de mayor tamaño y ferocidad. Los guajolotes de granja provienen de guajolotes silvestres que fueron domesticados desde los tiempos prehispánicos.

Alimentación:

Omnívora. Su dieta consiste principalmente de semillas, nueces, frutos, hojas, raíces; también insectos, invertebrados terrestres, pequeños vertebrados.


Distribución y Presencia:

Se distribuye desde el este y suroeste de E.U.A. y en el norte de México. En México se distribuye en los bosques de la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental, además de la planicie costera del golfo en Tamaulipas. En el PNCM se encuentra en los bosques de encino y pino durante todo el año.

Estado de conservación:

Se encontraba listado en la NOM-059, pero la recuperación paulatina de sus poblaciones ha permitido que esta especie ya no se encuentre listada en ninguna categoría de riesgo.





Ubicación

Paloma Huilota

Mouring Dove

Zenaida macroura

Señas de campo:

Es una paloma esbelta de tamaño mediano, tiene cola larga y puntiaguda. Su cuerpo, cabeza, dorso, plumas cobertoras son de color gris castaño. Las plumas de vuelo de las alas son de color gris oscuro. Las cobertoras tienen unos puntos negros bien definidos. El pico es negro y las patas son rojas. Tienen una mancha verde iridiscente en el costado del cuello. Las plumas alrededor del ojo (anillo ocular) de color azulado. En el aire se pueden apreciar las puntas blancas de las plumas de la cola. Vuela dando aleteos marcados. Su canto es fácilmente reconocible; suena como un hueco y lastimero hua, cúú, cúú, cú.

Hábitat y Hábitos:

Se encuentra en tierras de cultivo, ciudades, áreas abiertas, bosques, mezquitales, matorrales, pastizales y desiertos. Es una paloma que tanto puede andar solitaria como en grupos de cientos de individuos. Busca alimento principalmente en áreas abiertas, recogen semillas caídas de plantas silvestres o cultivos, y en ocasiones insectos; raramente recogen semillas o frutos en árboles. En áreas silvestres es una ave muy temerosa que vuela a la primer señal de peligro, a diferencia de las que viven en ciudades donde puede observarse comiendo en los parques.

Alimentación:

Herbívora. Su dieta consiste de semillas, incluyendo semillas desperdiciadas en los campos de cultivo.


Distribución y Presencia:

Se distribuye desde el sur de Canadá hasta Panamá. En México se distribuye ampliamente hasta el istmo de Tehuantepec, anidando principalmente en la sección central; es rara en Chiapas, casual en Yucatán.

Estado de conservación:

De acuerdo a la IUCN y la legislación mexicana es una especie fuera de peligro. Sus poblaciones no están amenazadas.





Ubicación

Cotorra Serrana Oriental

Maroon-fronted parrot

Rhynchopsitta terrisi

Es el ave más emblemática del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Pertenece al grupo de los loros y cotorros.

Señas de campo:

Es un ave de talla grande. Su cuerpo, alas, cola y cabeza son de color verde brillante. La frente es de color marrón intenso, su pico fuerte tiene forma de gancho, de color negro en los adultos y color hueso en los jóvenes. Los ojos son de color ámbar con el anillo ocular amarillo pálido. Presenta una mancha roja en el borde de las plumas cobertoras marginales de las alas, asemejando un "hombro" rojo. Las alas son medianas con una coloración oscura por debajo de ellas. Presenta las plumas de los muslos rojo brillante. Las patas son de color oscuro. Su cola es larga y puntiaguda.

Hábitat y Hábitos:

Se encuentra en los bosques de pino de las tierras altas del noreste de México. Es una especie gregaria, formando normalmente colonias para la anidación. Sus nidos se encuentran en cavidades de paredes y relices altos e inaccesibles de las montañas. Son aves longevas y monógamas, formando parejas de por vida. Durante la primavera se le puede observar alimentándose del néctar y semillas de las flores de agave, tiempo durante el cual se pueden ver varios individuos perchando en los quiotes de los agaves. La cotorra serrana depende de la conservación de los bosques de pino y la protección de las paredes donde anidan para su supervivencia.

Alimentación:

Herbívora. Se alimenta de piñones, frutos, bellotas, brotes de coníferas y ocasionalmente del néctar de las flores de agave.


Distribución y Presencia:

Es un ave endémica a México, es decir, solo se encuentra en las montañas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y en ningún otro lugar del planeta. Presenta movimientos estacionales; durante los meses de verano y otoño anida en las montañas de Coahuila y Nuevo León, pasa el invierno en el sur de Nuevo León, Tamaulipas y posiblemente San Luis Potosí.

Estado de conservación:

De acuerdo a la NOM-059, esta especie está amenazada, por lo que es necesario propiciar la recuperación y conservación de las poblaciones silvestres y de los hábitats donde se encuentran. De acuerdo a la IUCN es una especie vulnerable y con su población disminuyendo.





Ubicación

Correcaminos norteño

Greater Roadrunner

Geococcyx californianus

Señas de campo:
Es un ave inconfundible, tiene cola, cuerpo y cuello largos. Tiene una apariencia completamente rayada de colores café claros, grises y negros iridiscentes. El abdomen y vientre son color blanco crema. Las plumas de la parte superior de la cabeza son ligeramente largas y cuando se erecta asemejan una cresta negra rayada y "despeinada". Las plumas de vuelo de las alas y las plumas de la cola son negras iridiscentes. Sus alas cortas y redondas muestran una media luna blanca cuando aletea. Sus patas son fuertes y largas, adaptadas para correr. La parte posterior del ojo carece de plumas, la piel expuesta es de color azul y rojo.


Hábitat y Hábitos:
Se encuentra en áreas abiertas áridas, desiertos pedregosos, matorrales secos, mezquitales, bosques de piñón y juníperos. Es un ave de hábitos terrestres, percha en cercos o rocas. Se desplaza caminando o corriendo. Rara vez vuela, generalmente sólo planea cuando desciende de una rama alta. Puede correr a velocidades de 32 km/h, además de que puede cambiar de dirección ágilmente de un momento para otro. Su agilidad y velocidad le permiten escapar de sus depredadores naturales. Puede irrigar profusamente de sangre la piel desnuda posterior al ojo, dando a la piel una apariencia de color azul y rojo brillantes; hace este despliegue para expresar alerta.

Alimentación:
Carnívora–Omnívora. Se alimenta de lagartijas, roedores, otras aves, huevos, serpientes, incluyendo serpientes de cascabel, insectos, frutos y semillas.

Distribución y Presencia:
Se distribuye desde el suroeste de E.U.A., hasta el centro de México. En México se encuentra desde el norte pasando por la altiplanicie mexicana hasta el centro del país. En el PNCM se le puede encontrar durante todo el año en las zonas áridas, mezquitales y matorrales.

Estado de conservación:
De acuerdo a la IUCN y la legislación mexicana es una especie fuera de peligro. Sus poblaciones no están amenazadas.





Ubicación

Colibrí pico ancho

Broad-billed Hummingbird

Cynanthus latirostris

Señas de campo:

Existen diferencias marcadas entre machos-hembras y adultos-jóvenes. El macho tiene un plumaje verde oscuro que a la distancia se aprecia negro. Con luz adecuada su plumaje iridiscente permite ver su garganta azul y su partes inferiores verde azuladas. Su pico es ancho color rojo brillante con la punta negra. Su cola es ancha y oscura. La hembra tiene el pico negro por la parte de arriba, rojo en la parte de abajo y la punta negra. Su espalda es color verde esmeralda y la cabeza verde pardo. Tiene una mancha que asemeja una "ceja" blanca arriba del ojo. Su garganta, pecho y vientre son color gris. Su cola ancha es color azul verdusca. El juvenil macho asemeja a la hembra adulta pero con la cola azul oscura, la cola con puntas blancas. La garganta y pecho con manchas azules y verdes.

Hábitat y Hábitos:

Se encuentra en bosques de matorral áridos y semi-áridos, desde el nivel del mar hasta las montañas, cañones desérticos, laderas rocosas, agaves, mezquitales y también en bosques húmedos y riberas de ríos.

Alimentación:

Nectarívoro. Se alimenta del néctar de las flores. También se alimenta de los insectos pegados al néctar.

Distribución y Presencia:


Se distribuye desde el suroeste de E.U.A. hasta el norte y centro de México.

En el PNCM se puede encontrar durante los meses de verano en prácticamente todos los ecosistemas donde haya plantas con flores.

Estado de conservación:

De acuerdo a la IUCN y la legislación mexicana es una especie fuera de peligro. Sus poblaciones no están amenazadas, con excepción de una subespecie presente en las Islas Marías que está sujeta a protección especial.





Ubicación

Trogón elegante
Elegant Trogon
Trogon elegans

Señas de campo:
Es un ave prácticamente inconfundible. El macho tiene la espalda, nuca y parte del pecho verde brillante. Su cabeza es de color verde oscuro con pico amarillo. Tiene un anillo ocular color rojo. Sus partes inferiores son de color rojo brillante. Una banda blanca cruza el pecho. La cola larga y de punta cuadrada es color bronce iridiscente. La punta tiene una banda ancha negra. Las plumas cobertoras del ala son gris claro. La hembra presenta la cabeza, garganta y espalda de color gris pardo. El vientre es rojizo y el pecho es gris claro. La parte superior de la cola es color bronce. Tiene una mancha blanca que pareciera escurrir del ojo hacia atrás. En la cola se le ve un dibujo el cual es vermiculado o con barras angostas interrumpidas por tres franjas anchas blancas.


Hábitat y Hábitos:
Se encuentra en bosques de pino, encino y sicomoros, a veces en bosques deciduos en las riberas de los ríos. Es un ave que acostumbra perchar tranquilamente en las ramas de los árboles, moviendo la cabeza y observando detenidamente el alrededor, hasta que vuela espontáneamente para atrapar un fruto o insecto. En algunos lugares lo llaman "pájaro bandera" debido a la coloración rojo-blanco-verde del macho. Su peculiar canto suena como un repetido COA-COA-COA.

Alimentación:
Omnívora. Se alimenta de una gran variedad de frutos e insectos.

Distribución y Presencia:
Se distribuye desde el suroeste de E.U.A. hasta Costa Rica. En México se encuentra en las tierras altas de la Sierras Madre Oriental y Occidental hacia el sur. En el PNCM se le puede observar en los cañones donde hay sicomoros y encinos. Es una especie residente y puede ser observada durante todo el año.

Estado de conservación:
De acuerdo a la IUCN y la legislación mexicana es una especie fuera de peligro. Sus poblaciones no están amenazadas.





Ubicación

Momoto corona azul

Blue-crowned Motmot

Momotus momota

Señas de campo:

Es un ave peculiar e inconfundible. Las partes superiores y la nuca son de color verde brillante. Su pecho y vientre de color verde olivo. Tiene una máscara negra delineada por una delgada línea color turquesa. La parte superior de la cabeza es color azul turquesa. El pico aserrado es de color negro. Los ojos son rojos. Las plumas de vuelo del ala son azul verduscas. Su peculiar cola asemeja un reloj de péndulo con las puntas azules y con el extremo negro.

Hábitat y Hábitos:

Se encuentra en bosques húmedos, bosques de encino, vegetación secundaria, claros de bosque, plantíos. Generalmente se puede encontrar en las partes bajas y medias del bosque, desde donde busca alimento. A veces hace llamados desde la copa de los árboles. A menudo mueve su cola de lado a lado, dando aún mas la apariencia de un reloj de péndulo.

Alimentación:

Omnívora. Se alimenta de lagartijas, insectos y diversa variedad de frutos.

Distribución y Presencia:


Desde el este de México hasta el noroeste de Argentina y Paraguay. En México se distribuye desde las estribaciones de montaña de Nuevo León y las tierras bajas del centro de Tamaulipas hacia el sur. Específicamente, en el noreste de México encontramos una subespecie endémica a México la cual se diferencia por tener la parte superior de la cabeza completamente azul. En el PNCM se puede encontrar durante todo el año en cañones, cerca de los ríos y arroyos, y en bosques de encino, matorral submontano.

Estado de conservación:

De acuerdo a la IUCN y la legislación mexicana es una especie fuera de peligro. Sus poblaciones no están amenazadas.

Momoto corona azul





Ubicación

Martín-Pescador de collar

Ringed Kingfisher

Megaceryle torquata

Señas de campo:

Es el martín pescador mas grande del continente americano. Las partes superiores son de color azul-grisáceo y las partes inferiores rojizas ladrillo. El pico es masivo con la base de color marfil. Tiene una cresta eréctil, el cuello y garganta son blancos.

La hembra tienen una banda ancha azul-gris cruzándole el pecho. El macho carece de esta banda y las plumas cobertoras inferiores de la cola son blancas. Las patas son pequeñas comparadas con el tamaño del cuerpo.

Hábitat y Hábitos:

Se encuentra en cuerpos de agua; arroyos, ríos, lagos. Es un ave conspicua y ruidosa comúnmente observada sobrevolando sobre el agua o perchando en ramas, postes y cables. Se le observa de manera solitaria o en parejas. Para alimentarse se zambulle desde la rama de un árbol como todos los martín pescadores, o sosteniendo el vuelo en el aire y lanzándose de cabeza. Tiene la costumbre de golpear la presa contra la superficie donde se posa (rama, piedra, etc.)

Alimentación:

Carnívora. Su dieta consiste principalmente de peces, insectos, anfibios, reptiles o pequeños mamíferos.

Distribución y Presencia:

Se distribuye desde el sur de Texas hasta la tierra del fuego. En México se encuentra en la vertiente del pacífico desde Sinaloa hacia el sur; en la vertiente del Golfo desde la parte baja del Río Bravo hacia el sur y este. En el PNCM se observa a las orillas de los ríos.

Estado de conservación:

De acuerdo a la IUCN y la legislación mexicana es una especie fuera de peligro. Sus poblaciones no están amenazadas.

Martín-Pescador de collar





Ubicación

Carpintero cheje

Golden-fronted Woodpecker

Melanerpes aurifrons

Señas de campo:

Es un ave con las partes superiores marcadamente rayadas blanco-negro. La rabadilla es blanca y la cola negra. El pecho y abdomen son de color gris claro. El macho tiene la parte superior de la cabeza roja y la nuca amarilla-rojiza. La hembra carece del parche rojo y la nuca es amarilla. Cuando vuela se puede observar el parche blanco que tiene en cada ala.

Hábitat y Hábitos:

Se puede encontrar en bosques abiertos y semi-abiertos con árboles dispersos, bosques de matorral, mezquitales, bosques de galería y arboledas en las ciudades.

Es un carpintero que anda tanto solitario como en parejas. Se alimenta en la parte media y alta de los árboles.

Con sus fuertes patas, garras y la ayuda de su cola se sostiene de la corteza de los árboles, donde se puede observar avanzando verticalmente en busca de comida. Las cavidades que hacen en los árboles con sus duros picos pueden servir como nidos para otras aves como búhos y gorriones.

Alimentación:

Omnívora. Se alimenta de insectos que encuentra en la corteza de los árboles, así como de diversos frutos que incluyen bellotas y bayas.

Distribución y Presencia:

Se distribuye desde el sureste de E.U.A. hasta Nicaragua. En México se encuentra desde el noreste y centro del país hacia el sur. En el PNCM se puede observar en la vegetación de matorral tamaulipeco espinoso y matorral submontano.

Estado de conservación:

De acuerdo a la IUCN la legislación mexicana es una especie fuera de peligro. Sus poblaciones no están amenazadas.





Ubicación

Carpintero bellotero

Acorn Woodpecker

Melanerpes formicivorus

Señas de campo:

Es un carpintero con las partes superiores de color negro brillante. La corona es de color rojo. La parte frontal de la cabeza y la garganta son de color crema. El ojo, el vientre y la rabadilla son blancos. El pecho negro moteado. En la hembra la parte frontal de la corona es negra continuando con un parche rojo menor al del macho. Al volar se puede ver una mancha blanca redonda en cada ala.

Hábitat y Hábitos:

Se puede encontrar principalmente en bosques de encino, bosque de pino-encino, arboledas, bosques mixtos, estribaciones de montaña. Es una especie gregaria con un sistema social complejo. Se alimenta principalmente de bellotas y otras nueces durante el invierno, las cuales recolecta durante el verano. Durante el otoño se le puede observar martillando y haciendo cavidades en los troncos de los árboles, colocando en cada hueco una bellota. Se han encontrado hasta 30,000 bellotas en un solo tronco almacenadas por las colonias de carpinteros belloteros.

Los troncos "graneros" son fáciles de localizar debido a los ruidosos carpinteros que vuelan en las inmediaciones.

Alimentación:

Omnívora. Se alimenta principalmente de bellotas y otras nueces durante el invierno, y de insectos durante el verano. También se alimenta de frutos, savia y granos.

Distribución y Presencia:

Se distribuye desde el suroeste de E.U.A. hasta Panamá y Colombia. En México se encuentra en las tierras altas del norte y centro del país, hacia el sur por Chiapas y Tabasco.

En el PNCM se le puede encontrar en las partes altas y laderas de las montañas, así como en los cañones, siempre y cuando haya bosques de encino y pino. Es una especie residente que puede ser encontrado durante todo el año.

Estado de conservación:

De acuerdo a la IUCN la legislación mexicana es una especie fuera de peligro. Sus poblaciones no están amenazadas, con excepción del bellotero de La Laguna, B.C.S.





Ubicación

Mosquero cardenal

Vermilion Flycatcher

Pyrocephalus rubinus

Señas de campo:
Es un ave pequeña sobresaliente perteneciente al grupo de los papamoscas. El macho es inconfundible; su cabeza, pecho y vientre son color rojo carmesí. Tiene un antifaz negro que se extiende hasta la nuca. Las partes superiores son de color negro. La hembra es gris pardo en las partes superiores. Las plumas de vuelo del ala y la cola son negras. La garganta es blanca, el pecho es blanco rayado, el vientre es rosado. Presenta un antifaz gris pardo.

Hábitat y Hábitos:
Se le puede encontrar en áreas abiertas y semi-abiertas con árboles dispersos, desiertos, mezquitales, bosques riparios y matorrales, casi siempre cerca del agua. Se le puede observar perchando en postes o ramas bajas, moviendo constantemente la cola de arriba-abajo. Cuando divisa un insecto volador, remonta el vuelo espontáneamente buscando capturarlo, después regresa a la percha en espera de otro insecto.


Alimentación:
Insectívora. Se alimenta principalmente de insectos voladores los cuales captura en el aire.

Distribución y Presencia:
Se distribuye desde el suroeste de E.U.A hasta Argentina. En México en las zonas semiáridas o áridas de casi todo el país. En el PNCM se le puede encontrar durante todo el año es las áreas abiertas áridas, bosques riparios y praderas.

Estado de conservación:
De acuerdo a la IUCN y la legislación mexicana es una especie fuera de peligro. Sus poblaciones no están amenazadas.

Mosquero cardenal





Ubicación

Chara pecho gris

Mexican-jay

Aphelocoma ultramarina

Señas de campo:

Es una ave conspicua de talla mediana. Las partes superiores son de color azul brillante, a excepción de la espalda que es de color azul cenizo, presentando un ligero contraste entre la espalda y la cabeza y cola. Las partes inferiores y garganta son blancuzcas. El pico es negro al igual que las patas.

Puede escucharse a varios kilómetros de distancia su característico llamado; un áspero whink-whink-whink.

Hábitat y Hábitos:

Se le puede encontrar en las laderas de montañas y cañones con bosques de encino y pino. También en bosques de juníperos y chaparrales. Es una especie gregaria que se desplaza en grupos por el bosque. Los individuos más experimentados fungen como centinelas, que al observar cualquier señal de peligro, hacen sus ásperos llamados para alertar y proteger a la parvada. Sus llamados no solo alertan a las aves de su grupo, sino a otras especies de aves y mamíferos como ardillas y venados. La chara pecho gris tiene un sistema cooperativo de reproducción donde aves parientes de la pareja reproductora ayudan en el cuidado y alimentación de los polluelos.

Alimentación:

Omnívora. Se alimenta de diferentes frutos, nueces y bayas del bosque, así como de pequeños reptiles, insectos e incluso de los polluelos de los nidos de otras aves.

Distribución y Presencia:


Se distribuye desde el sur de Arizona y Texas hasta el centro de México. En México ampliamente distribuido en las montañas de la Sierra Madre Oriental y Occidental y Eje Neovolcánico Transversal, así como otras partes del centro del país. En el PNCM se le puede encontrar fácilmente durante todo el año en los cañones y laderas con bosques de pino y encino.

Estado de conservación:

De acuerdo a la IUCN y la legislación mexicana es una especie fuera de peligro. Sus poblaciones no están amenazadas.

Chara Pecho Gris





Ubicación

Chara verde

Green jay

Cyanocorax yncas

Señas de campo:

Es un ave parecida en estructura a la chara pecho gris pero de menor tamaño. Su coloración la hacen inconfundible. Su parte superior es de color verde limón, la cola es verde azulada. La parte superior de la cabeza, los "cachetes" y las "cejas" son azul brillantes. Las otras partes de la cabeza y garganta son de color negro. El pecho y abdomen son de color amarillo verdusco. La parte inferior de la cola y las plumas cobertoras inferiores de la cola son de color amarillo brillante. Cuando vuela, abre las alas de la cola, pudiéndose observar las plumas exteriores color amarillo brillante y las centrales de color verde azulado.

Hábitat y Hábitos:

Se encuentra en bosques deciduos, matorrales, matorral submontano, zonas de transición entre vegetación secundaria y bosques de encino-pino. Desde tierras bajas hasta las tierras altas húmedas. La chara verde es una especie gregaria y ruidosa, desplazándose en grupo por entre la vegetación. Debido a su color, puede pasar fácilmente desapercibida entre la vegetación pero fácilmente localizable por su canto.

Alimentación:

Omnívora. Se alimenta de insectos, pequeños invertebrados y vertebrados, huevos de otras aves, polluelos, diversas semillas y frutos.

Distribución y Presencia:

Se distribuye desde el sur de Texas hasta Venezuela y Bolivia. En México se encuentra en el este por toda la vertiente del Golfo desde Tamaulipas hacia el sur incluyendo la Península de Yucatán, además de encontrarse en la vertiente del Pacífico desde Nayarit hasta Chiapas. En el PNCM se puede encontrar en los pies de las montañas en la vegetación de matorral submontano y matorral tamaulipeco, así como en las zonas de transición con los bosques de encino-pino.

Estado de conservación:

De acuerdo a la IUCN y la legislación mexicana es una especie fuera de peligro. Sus poblaciones no están amenazadas.





Ubicación

Cuervo Común

Common raven

Corvus corax

Señas de campo:

Es un ave de talla grande. Su pico largo, fuerte y robusto es diagnóstico. Es de color negro azabache con un brillo púrpura a la luz del sol. Las plumas del cuello y garganta tienen una apariencia desaliñada y cuando el aire las "despeina" es posible ver el color gris de la base de las plumas, a diferencia de otras especies de cuervos. Cuando vuela es posible apreciar la cola en forma de cuña, así como las largas y angostas alas. Vuela alternando el aleteo con planeo. A diferencia de otros cuervos, éste planea con las alas extendidas, sin doblar las puntas. Su voz es un ronco y áspero cr-r-ruck, cr-r-ruck

Hábitat y Hábitos:

Se le puede encontrar en una gran diversidad de hábitats; tierras áridas, semi-húmedas, tierras abiertas y semi-abiertas, desiertos, montañas rocosas, acantilados costeros, áreas ganaderas, de cultivo y ciudades. El Cuervo Común es un ave que anda solitaria, en parejas o en parvadas. Es un ave sumamente inteligente que se vale de ella para obtener su alimento y establecer las jerarquías sociales. Es posible ver a los cuervos interactuando entre ellos en el aire, dando piruetas y vuelos acrobáticos. Es una especie generalmente monógama que permanece con su pareja de por vida.

Alimentación:

Omnívora. Se alimenta principalmente de carroña; también de pequeños vertebrados, huevos de aves y polluelos (especialmente en aves marinas), insectos, otros invertebrados; basura, semillas y frutos.

Distribución y Presencia:

Es un especie de distribución amplia; Norteamérica, Eurasia, Groenlandia y norte de África. En México se distribuye ampliamente desde el norte y noroeste hacia el centro del país hasta el sur en Chiapas. En el PNCM se puede encontrar en las partes montañosas, cañones y áreas áridas durante todo el año.

Estado de conservación:

De acuerdo a la IUCN y la legislación mexicana es una especie fuera de peligro. Sus poblaciones no están amenazadas.





Ubicación

Carbonero embridado

Bridled Titmouse

Baeolophus wollweberi

Señas de campo:
Es un ave pequeña de color gris oscuro en las partes superiores y gris claro en las inferiores. Su cresta y el rostro en colores blanco y negro son característicos de esta especie. Tiene la garganta negra. Su pico es corto y fuerte.

Hábitat y Hábitos:
Se le encuentra en zonas boscosas, en laderas y cañones de montaña con bosques de encinos, sicomoros, pino y juníperos.
Es un ave social que anda en pequeños grupos. Es un ave inquisitiva que suele acercarse a la gente que camina por el bosque.

Alimentación:
Omnívora. Su dieta consiste principalmente de insectos adultos y larvas. En invierno, se alimenta sobre todo de bellotas y las larvas que crecen dentro. Busca su alimento en la corteza y ramas.

Distribución y Presencia:
Se distribuye en montañas desde el sureste de E.U.A. hasta el sur de México. En México se distribuye en las tierras altas de la Sierra Madre Occidental y Sierra Madre Oriental hacia el sur en la planicie central hasta el norte del Istmo de Tehuantepec.

Estado de conservación:
De acuerdo a la IUCN y la legislación mexicana es una especie fuera de peligro. Sus poblaciones no están amenazadas.

Carbonero embridado





Ubicación

Matraca del desierto

Cactus Wren

Campylorhynchus brunneicapillus

Señas de campo:
Es un ave mediana, pero es la más grande de las matracas presentes en el PNCM. Tiene una apariencia rayada en las partes superiores y un denso manchado en el pecho y flancos; tiene pico robusto y cola redonda al vuelo. Las plumas superciliares son blancas dando la apariencia de un larga "ceja" blanca. La corona es de color café ocre. El vientre y flancos son color crema.

Hábitat y Hábitos:
Se encuentra en hábitats desérticos, estribaciones de montañas áridas, isotales o zonas con palmas yuca y mezquitales.
Es un ave que anda en pareja o en grupos por las partes bajas y medias de los arbustos y matorrales. Tanto el macho como la hembra construyen un nido voluminoso de forma esférica en las plantas como el coyonoxtle, nopales y mezquites. Las espinas de estas plantas disuaden a posibles depredadores de entrar al nido a consumir los huevos o polluelos.


Alimentación:
Omnívora. Se alimenta de semillas, frutos, insectos, néctar y ocasionalmente de pequeñas lagartijas.

Distribución y Presencia:
Se distribuye desde el suroeste de E.U.A hasta el centro de México. En México se encuentra ampliamente distribuido en las zonas áridas del centro y norte del país. En el PNCM se encuentra en las partes bajas áridas. Es posible verlos cerca de la presa Rompepicos y la Huasteca, así como en los demás sitios áridos del parque.

Estado de conservación:
De acuerdo a la IUCN y la legislación mexicana es una especie fuera de peligro. Sus poblaciones no están amenazadas.

Matraca del desierto





Ubicación

Reyezuelo de rojo

Ruby-crowned Kinglet

Regulus calendula

Señas de campo:

Es un ave pequeña de color gris olivo con dos barras claras en cada ala. Las alas negruzcas presentan un delineado amarillo-verdusco en cada pluma de vuelo. Presenta un anillo ocular incompleto de color blanco. Los machos presenta un parche de color escarlata en la parte superior de la cabeza, aunque a veces es solo visible cuando erecta las plumas de la corona. Los tarsos de las patas son oscuros mostrando contraste con las falanges o dedos de color amarillento.

Hábitat y Hábitos:

Se le encuentra en bosques de coníferas; en invierno también se le encuentra en otras tierras boscosas y arbustos como encinares y matorrales. Es un ave que anda en parejas o pequeños grupos, comúnmente asociado con otras especies de aves mientras forrajea. El reyezuelo de rojo es un ave sumamente activa; mueve constantemente las alas y cola, continuamente brincando entre rama y rama en busca de alimento. Ocasionalmente hace un vuelo sostenido cerca de la punta de las ramas para recoger insectos.

Alimentación:

Omnívora. Su dieta consiste de insectos y los huevecillos de estos, savia de los árboles, algunas vallas, incluyendo algunas arañas y semillas.


Distribución y Presencia:

Se distribuye desde Alaska y Canadá hasta México. En México se observa ampliamente en invierno en el territorio nacional excepto en la Península de Yucatán y en las tierras al sur del Istmo de Tehuantepec. En el PNCM se observa durante el invierno en zonas boscosas y arbustos.

Estado de conservación:

De acuerdo a la IUCN y la legislación mexicana es una especie fuera de peligro. Sus poblaciones no están amenazadas, con excepción de una subespecies de la Isla Guadalupe que se encuentra en peligro de extinción.





Ubicación

Perlita azulgris

Blue-Gray Gnatcatcher

Polioptila caerulea

Señas de campo:

Es un ave pequeña de color gris olivo con dos barras claras en cada ala. Las alas negruzcas presentan un delineado amarillo-verdusco en cada pluma de vuelo. Presenta un anillo ocular incompleto de color blanco. Los machos presenta un parche de color escarlata en la parte superior de la cabeza, aunque a veces es solo visible cuando erecta las plumas de la corona. Los tarsos de las patas son oscuros mostrando contraste con las falanges o dedos de color amarillento.

Hábitat y Hábitos:

Se le encuentra en bosques de coníferas; en invierno también se le encuentra en otras tierras boscosas y arbustos como encinares y matorrales. Es un ave que anda en parejas o pequeños grupos, comúnmente asociado con otras especies de aves mientras forrajea. El reyezuelo de rojo es un ave sumamente activa; mueve constantemente las alas y cola, continuamente brincando entre rama y rama en busca de alimento. Ocasionalmente hace un vuelo sostenido cerca de la punta de las ramas para recoger insectos.

Alimentación:

Omnívora. Su dieta consiste de insectos y los huevecillos de estos, savia de los árboles, algunas vallas, incluyendo algunas arañas y semillas.

Distribución y Presencia:

Se distribuye desde Alaska y Canadá hasta México. En México se observa ampliamente en invierno en el territorio nacional excepto en la Península de Yucatán y en las tierras al sur del Istmo de Tehuantepec. En el PNCM se observa durante el invierno en zonas boscosas y arbustos.

Estado de conservación:

De acuerdo a la IUCN y la legislación mexicana es una especie fuera de peligro. Sus poblaciones no están amenazadas, con excepción de una subespecies de la Isla Guadalupe que se encuentra en peligro de extinción.





Ubicación

Centzontle norteño

Northern Mockingbird

Mimus polyglottos

Señas de campo:

Es un ave de talla mediana de color gris en las partes superiores y blanca en las inferiores. Su cola larga es negra con las plumas exteriores blancas. Su pico es negro, tiene una delgada línea ocular negra. Cuando vuela se pueden apreciar sus largas y anchas alas negras con una mancha grande redonda blanca en cada ala.

Hábitat y Hábitos:

Se le puede encontrar en diversos tipos de hábitats; áreas abiertas con manchones densos de arbustos, mezquitales, matorrales, arroyos en áreas desérticas, potreros zonas suburbanas. Es un ave conspicua, relativamente fácil de encontrar; se puede observar en arbustos altos o cercas al lado de los caminos. Busca comida en las partes bajas y medias de la vegetación, comúnmente visto en el suelo forrajeando. La característica distintiva del centzontle es su canto. Su canto esta constituido por una gran variedad de frases melódicas en series repetitivas. Su capacidad de imitar el canto de otras aves es sorprendente, incluso imitando alarmas de autos y otros sonidos. Su repertorio incluye en algunos casos mas de 400 cantos distintos.

Alimentación:

Omnívora. Se alimenta de gran variedad de frutos, bayas, semillas, insectos, pequeños vertebrados.

Distribución y Presencia:


Se distribuye desde el sureste de Canadá hasta el sur de México, incluyendo las islas del Caribe. En México se distribuye ampliamente desde el norte hasta el Istmo de Tehuantepec. Desde el nivel del mar hasta los 2100 m. Las poblaciones más norteñas son parcialmente migratorias, moviéndose hacia el sur en invierno.

Estado de conservación:

De acuerdo a la IUCN y la legislación mexicana es una especie fuera de peligro. Sus poblaciones no están amenazadas. Sin embargo sus poblaciones se han visto reducidas en varios lugares por las capturas incontroladas para la venta como mascota.

Centzontle norteño





Ubicación

Cuitlacoche pico curvo

Curve-billed Trasher

Toxostoma curvirostre

Señas de campo:

Es un ave de talla mediana, el plumaje de las partes superiores es pardo grisáceo y en la partes inferiores es claro, el pecho y flancos esta cubierto de manchas grises. Las plumas cobertoras de la parte inferior de la cola son color beige claro. Su pico largo y curvo es característico. El ojo de los adultos es anaranjado o rojo, mientras que los individuos inmaduros tienen los ojos amarillos. Su cola parda es larga. Su canto es una serie musical de notas y frases. Su llamado es un líquido y agudo ¡juit-juit!

Hábitat y Hábitos:

Se le encuentra en desiertos, matorrales áridos, límites de bosques de juníperos y cedros con arbustos, incluso en áreas verdes de zonas urbanas.

Es un ave que se observa en parejas o en grupos entre los arbustos de las zonas áridas. Es común ver a esta ave perchando en los cercos y al lado de los caminos.

Se alimenta principalmente al nivel de suelo. A veces se le ve asociada con otras especies de aves desplazándose en grupos en búsqueda de comida. Al igual que la matraca del desierto, hace sus nidos en arbustos o plantas con espinas para proteger a sus huevos o polluelos.

Alimentación:

Omnívora. Se alimenta de insectos y otros artrópodos, los cuales captura con su pico curvo debajo de hojas y otros detritos, también se alimenta de semillas de cactáceas, tunas y otras bayas.

Distribución y Presencia:

Se distribuye desde el oeste de EUA hasta el sur de México. En México se encuentra desde el norte pasando por la altiplanicie central hasta las tierras altas de Oaxaca. En el PNCM se encuentra en las tierras áridas con vegetación dispersa.

Estado de conservación:

De acuerdo a la IUCN y la legislación mexicana es una especie fuera de peligro. Sus poblaciones no están amenazadas.

Cuitlacoche pico curvo





Ubicación

Chipe trepador

Black -and-white Warbler

Mniotilta varia

Señas de campo:

Es un ave pequeña inconfundible. Su cuerpo densamente rayado asemeja una "cebra". La espalda es negra con rayas blancas y las alas negras con dos bandas blancas. Las mejillas y la garganta son negras, y el resto de la parte inferior es blanca, con abundantes rayas negras en el pecho y los flancos. La cabeza tiene un rayado sobresaliente en blanco y negro. La hembra es similar, pero con las mejillas grises, la garganta y el pecho de color blanco y el rayado del costado negruzco opaco. Los flancos, y con frecuencia la cara, están teñidas de beige.

Hábitat y Hábitos:

Se le puede encontrar prácticamente en cualquier matorral alto durante la migración, aunque en invierno prefiere los árboles de buen tamaño en el bosque. Se puede observar tanto en bosques de encino-pino, matorral submontano, vegetación secundaria, parques y jardines. Busca alimento al trepar hacia arriba y abajo por los troncos y a lo largo de las ramas grandes sosteniéndose con sus fuertes patas y uñas. De la corteza obtiene los insectos, larvas, pupas y arañas. Cuando avanza verticalmente y de cabeza por las ramas, no utiliza la cola como soporte, a diferencia de los carpinteros. En raras ocasiones revolotea para atrapar una presa de la superficie inferior de una rama.

Alimentación:

Insectívora. Se alimenta principalmente de insectos que encuentra en los troncos, ramas y follaje de los árboles y matorrales.


Distribución y Presencia:

Se distribuye desde las partes centrales y este de Canadá hacia el sur hasta Perú y Ecuador. Inverna desde el sur de E.U.A. hasta las Indias Occidentales y Ecuador. En México es una ave migratoria y visitante de invierno ampliamente distribuido. En el PNCM es un ave común durante el invierno. Durante los meses de otoño y primavera se pueden observar las aves migratorias.

Estado de conservación:

De acuerdo a la IUCN y la legislación mexicana es una especie fuera de peligro. Sus poblaciones no están amenazadas.





Ubicación

Chipe gorra rufa

Rufous-capped Warbler

Basileuterus rufifrons

Señas de campo:

Es un ave conspicua de talla pequeña. Los lados y la parte posterior del cuello son grisáceos, y el resto de la parte superior es verde oliva. El pecho es amarillo brillante, con un tinte gris en el costado y vientre. Los adultos muestran la corona y mejillas el rufo castaño. Las cejas, la mancha debajo del ojo y la barbilla son blancas.

Hábitat y Hábitos:

Omnívora. Se encuentra en bosques abiertos, arbustos en cañones, laderas y pies de montaña; matorral submontano y zonas de transición con bosque de encinos.

Es una especie gregaria que comúnmente se desplaza en grupos asociados con otras especies de aves. Busca alimento en las partes bajas y medias del bosque. Es una especie fácil de encontrar; es muy curiosa y no duda en acercarse a una persona que silba por el bosque.

Alimentación:

Omnívora. Se alimenta principalmente de insectos y otros artrópodos, así como de semillas y frutos.

Distribución y Presencia:


Se distribuye desde el noroeste de México (es casual al sur de Arizona y Texas) hasta el noroeste de Venezuela. En México se encuentra en las vertientes costeras y montañas desde el sureste de Sonora y oeste de Chihuahua, centro de Nuevo León y centro y oeste de Tamaulipas hacia el sur a través de Chiapas y Tabasco. Es un habitante común dentro del PNCM.

Estado de conservación:

De acuerdo a la IUCN y la legislación mexicana es una especie fuera de peligro. Sus poblaciones no están amenazadas.

Chipe gorra rufa





Ubicación

Chipe ala blanca

Painted redstart

Myioborus pictus

Señas de campo:
Es un ave llamativa de porte pequeño. Sus partes superiores, cabeza, cola y flancos son negros azabache. Presenta un parche grande blanco en cada ala y las plumas externas de la cola son blancas, tiene un parche grande rojo brillante en la parte inferior del pecho. Ambos sexos son parecidos. Una pequeña media luna blanca se encuentra debajo del ojo.


Hábitat y Hábitos:
Se encuentra en bosques de encino y pino principalmente. Se le puede ver en cañones, laderas y en bosques de galería. Es un ave relativamente fácil de encontrar debido a su llamativo pecho. Anda en las partes medias y altas de los árboles buscando alimento entre las ramas y follaje. En su postura habitual permanece con las alas y colas semiabiertas, moviendo constantemente la cola de un lado para otro. Es comúnmente observada junto con otras especies de aves mientras forrajea.

Alimentación:
Insectívora. Se alimenta principalmente de insectos que encuentra en la corteza, ramas y en el follaje de los árboles.

Distribución y Presencia:
Se distribuye desde las tierras altas de California en E.U.A hacia el sur hasta Honduras. En México se distribuye en la Sierra Madre Oriental y Occidental hacia el sur, en las tierras altas de Chiapas. En el PNCM se puede observar en las laderas y cañones donde haya bosques de encino y pino durante todo el año.

Estado de conservación:
De acuerdo a la IUCN y la legislación mexicana es una especie fuera de peligro. Sus poblaciones no están amenazadas.





Ubicación

Cardenal rojo

Northern Cardinal

Cardinalis cardinalis

Señas de campo:

Es un ave de talla mediana. El macho es inconfundible; de color rojo brillante con una cresta sobresaliente. Tiene una mancha negra en la base del pico extendiéndose hasta el ojo. Su pico rojo es grueso y de forma cónica. Su cola es relativamente larga. La hembra es café leonado con tintes rojizos en alas, cola y cresta. El vientre es blancuzco, el pico es rojo anaranjado.

Hábitat y Hábitos:

Se encuentra en diversos tipos de hábitats; matorrales áridos y submontanos, zonas de transición con bosques, vegetación densa en ríos, parques y ciudades. Viajan en parejas o pequeños grupos entre la densa vegetación. El macho, a pesar de ser tan llamativo, a veces es difícil de encontrar porque se esconde entre las ramas. La belleza de esta ave la he hecho víctima de los tramperos que las atrapan y venden en el mercadeo ilegal.

Alimentación:

Omnívora. Su grueso y fuerte pico cónico le permite abrir nueces y semillas duras, y poder alimentarse de una mayor variedad de frutos y semillas que otras especies de aves. Su dieta también incluye insectos.


Distribución y Presencia:

Desde el este sureste de Canadá pasando por el centro este de E.U,A y México hasta el norte de Guatemala y Belize. En México ampliamente distribuido por el norte, centro y vertiente del Golfo hasta la península de Yucatán. Presente también en la parte de planicie costera Pacífica en los estados de occidente. En el PNCM se le encuentra en las partes bajas y semiáridas en los matorrales.

Estado de conservación:

De acuerdo a la IUCN y la legislación mexicana es una especie fuera de peligro. Sus poblaciones no están amenazadas. Sin embargo sus poblaciones se han visto reducidas en varios lugares por las capturas incontroladas para la venta como mascota.





Ubicación

Bolsero cabeza negra

Audubon´s Oriole

Icterus graduacauda

Señas de campo:

Es un ave de talla mediana delgada y esbelta con la cola relativamente larga. Su pico es derecho y puntiagudo. Su cabeza, alas y cola son negras, la espalda y rabadilla son color amarillo olivo y las partes inferiores son amarillas. Ambos sexos son parecidos.

Los jóvenes son completamente amarillos opacos, a excepción de las alas que son oscuras. En la cabeza y garganta presentan algunas manchas negras.

Hábitat y Hábitos:

Se puede encontrar en zonas boscosas y arbustivas densas, hasta los 1800 m. Prefiere los bosques de encino y la vegetación cerca de cuerpos de agua. Es un ave que anda en parejas o en grupos pequeños. A veces asociado con otras especies de aves como charas verdes, tángaras y otros bolseros. Su coloración amarillenta le permite camuflarse muy bien entre el follaje, siendo más fácil encontrarlo por su canto melancólico. La forma de sus nidos varia desde una simple concavidad o bóveda en el suelo, hasta nidos largos entretejidos en forma de bolsa o calcetín, suspendidos en las ramas de los árboles.

Alimentación:

Omnívora. Se alimenta tanto de insectos, frutos, semillas, granos de desperdicios, etc. En ocasiones se les observa en las flores de los agaves buscando los insectos polinizadores.


Distribución y Presencia:

Se distribuye desde la parte sur de Texas por el este de México. En la vertiente del Pacífico se encuentra desde Nayarit hacia el sur hasta Oaxaca. En el PNCM se puede encontrar en los cañones donde hay vegetación riparia, en los encinares y bosques de pino.

Estado de conservación:

De acuerdo a la IUCN y la legislación mexicana es una especie fuera de peligro. Sus poblaciones no están amenazadas.





Ubicación

GLOSARIO

Amenazadas: Aquellas especies silvestres que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazo, si siguen operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones.

Anidación: En las aves es la fase del ciclo biológico en el que incuban o empollan a los huevos, desde que los ponen en el nido hasta que eclosionan.

Anillo ocular: Circulo de pequeñas plumas que rodean el ojo.

Área de distribución: Zona o área en la que normalmente vive una especie, incluye los sitios donde se reproduce, alimenta y muere.

Área Natural Protegida: superficie de tierra o mar especialmente dedicada a la protección y mantenimiento de la biodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados; manejada a través de medios legales, o de otros medios efectivos.

Auriculares: Plumas a lo largo del lado del oído del ave, a menudo llamado coberteras de oído o parches.

Barrado: Plumaje con líneas transversales, gruesas o finas, que contrastan con el resto del color.

Canto: Voz que tiene fines territoriales o sexuales. Es la vocalización más elaborada y generalmente es emitida por los machos.

Capucha o capuchón: La coloración de las plumas de la cabeza del ave. Dicha coloración contrasta abiertamente con el resto del plumaje.

Ceja: Línea por encima de cada ojo y ceja. También se llama banda superciliar.

Cera o cere: La zona carnosa en la parte superior de la base del pico que contiene las fosas nasales. Presente en algunas especies de aves, sobre todo entre las aves rapaces o falconiformes y loros o cotorros.

Coberteras: Plumas menores que estan en la base de las plumas grandes del vuelo (primarias y secundarias) y que sirven para dar soporte al ala.

Colonia: Grupo de aves que se reúnen para reproducirse o alimentarse juntos en una misma zona.

Corona: Parte superior de la cabeza entre la frente y la parte posterior de la cabeza.

Cresta: Protuberancia carnosa de la cabeza de un ave o plumas largas en la parte superior de la cabeza de un ave.

Dimorfismo sexual: Diferencias en el aspecto exterior de machos y hembras, especialmente en lo referente a porte, colores del plumaje y

ornamentos.

Diurnas: Aves que se alimentan y desarrollan su actividad durante el día.

Dorso: El plumaje y coloración en la nuca, espalda, hombros, cadera, y la parte superior de la cola.

Ecosistema: Sistema natural que está formado por un conjunto de organismos vivos (biocenosis) y el medio físico donde se relacionan (biotopo). Un ecosistema es una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat.

Endemismo: Se dice de una especie que solamente se encuentra en un área en particular.

Especie: Conjunto de individuos que son capaces de reproducirse entre sí y generar descendencia fértil, compartiendo rasgos fisonómicos, fisiológicos y conductuales.

Especies en peligro de extinción: Aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones en el Territorio Nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores tales como la destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros.

Frugívoro: Especie cuya dieta esta basada principalmente en frutos.

Género: Categoría taxonómica que agrupa a las especies.

Gregario: Especies que tienden a formar o congregarse en grupos.

Hábitat: Características de un lugar o territorio que necesita una determinada especie para sobrevivir y reproducirse.

Iridiscente: Plumas con brillos metálicos, que varían de color e intensidad de acuerdo a la posición de la pluma con respecto al sol u otra fuente luminosa.

Juvenil: ejemplar inmaduro, de tamaño similar al adulto, ocasionalmente con plumaje distinto.

Llamado: Sonidos cortos con que las aves indican peligro, asustan intrusos, mantienen la unión de un grupo de aves o para atraer el sexo opuesto.

Lores: Zona de la cara, entre la base del pico y el ojo.

Mandíbula: Cada una de las dos partes del pico de un ave (superior e inferior).

Migración: Los movimientos poblacionales que realizan las aves, a veces grandes distancias, de manera cíclica o estacional, generalmente coincidiendo con las estaciones del año o con la abundancia de algún tipo de

recurso alimenticio.

Monógamo: Especies que se aparean sólo con un individuo.

Morfología: Estudio de la forma de los animales.

Muda: Cambio del plumaje mediante pérdida y reposición de las plumas.

NOM-059-SEMARNAT-2010: Norma Oficial Mexicana donde se especifica el listado de las especies nativas de México de flora y fauna que se encuentran dentro de alguna categoría de riesgo. La norma incluye las especificaciones para la inclusión, exclusión o cambio en el listado de las especies en riesgo.

Nuca: Parte posterior del cuello del ave.

Omnívoro: Animal que come una gran variedad de alimentos, de origen tanto animal como vegetal.

Orden: Categoría taxonómica que agrupa a todas las familias.

Ornamental: Que se utiliza para adornar por ser atractivo a la vista.

Ornitología: Rama de la zoología que estudia a las aves en todos sus aspectos.

Parvada: Grupo de aves.

Paseriformes: Cualquiera de las aves pertenecientes al orden Passeriformes, que representan más del cincuenta por ciento de las aves del mundo. Son altamente evolucionados. Estas aves son capaces de cantar y tienen tres dedos en los pies apuntando hacia delante adaptados para posarse o perchar.

Perenne: Algo que se mantiene por mucho tiempo o para siempre. Cuando hace referencia a la flora se refiere a plantas que mantienen hojas verdes durante todo el año.

Pico: Las dos mandíbulas con que las aves toman la comida.

Pigmento: Sustancia que da color a huevos y plumas.

Plumaje: Se refiere a la cubierta de plumas de un ave. Las características específicas del plumaje permiten identificar en la mayoría de los casos la especie y sexo del ave que se observa.

Población: El conjunto de individuos de una especie silvestre, que comparten el mismo hábitat.

Pollo: Ave en el periodo que va desde su eclosión del huevo hasta adquirir su primer plumaje completo

Primarias: Plumas de vuelo más largas del ala, situadas en la parte exterior.

Protección especial: Aquellas especies que podrían llegar a encontrarse

amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la necesidad de propiciar su recuperación y conservación o la recuperación y conservación de poblaciones de especies asociadas.

Protegida: Son especies que están bajo la protección de las leyes que prohíbe cazarlas, destruir sus nidos o huevos, y otras medidas para permitir que vivan y se reproduzcan.

Rapaces: Son aves de presa o depredadoras que comen carne, incluye a los halcones, aguilillas, águilas, milanos, búhos, águilas pescadoras, y zopilotes.

Residente: Animal que permanece en un área durante todo el año.

Ribereña: Se encuentra en o cerca de una orilla del río, corriente, u otro cuerpo de agua.

Secundarias: Pumas de vuelo del ala, situadas en la parte central.

Subespecie: Subdivisión de una especie, usualmente indistinguible a no ser que el ejemplar se examine en mano. A menudo llamada raza.

Septentrional: Relacionado con la dirección hacia el Norte.

Tarso: Normalmente la parte desnuda de las piernas del ave. En ciertas especies están cubiertas de plumas pequeñas o plumones.

Terciarias: Plumas de vuelo, en número de tres, que se encuentran en la parte más interna del ala.

Territorial: Especie que defiende un área de alimentación o reproducción.

Territorio: Área que un animal o un grupo de animales defienden contra los intrusos, ya sea para defender un recurso alimenticio, nido, etc.

Volantón: Crías que se encuentra en la época de los primeros intentos de vuelo al tratar de dejar el nido.

Voz: Cualquier sonido que el ave emite por la boca.

Zona dorsal: Se usa para referirse en términos generales a toda la espalda, desde la base del cuello trasero al comienzo de la cola.

Zona ventral: Se usa para referirse en términos generales a toda la parte inferior, desde la base del cuello delantero, pecho, abdomen y comienzo de la cola.

BIBLIOGRAFÍA

AOU. 1998. Check-list of North American Birds. American Ornithologist´s Union. 7th edition 829 pp.

Cotera-Correa M., L. Scott-Morales, F. Heredia-Pineda, R. Henández-Martínez, J. Canales-Delgadillo. 2008. Aves del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, Nuevo León, México. Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Forestales. Informe final SNIB-CONABIO proyecto No. BK061, México D.F. 53 pp.

Diario Oficial de la Federación. 2010. NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. Publicada en el Diario Oficial de la Federación Jueves 30 de diciembre del 2010.

Escalante P., A. M. Sada y J. Robles Gil. 1996. Listado de nombres comunes de las aves de México. CONABIO. Asociación Sierra Madre. 32 pp.

Garza de León A. 2003. Aves de Coahuila: Guía de campo. 373 pp.

Howell S. N. G. y S. Webb. 1995. A guide to the birds of Mexico and Northern Central America. Oxford University Press, USA.

Kaufman K. 2000. Field guide to the birds of North America. Hillstar Editons L. C. 395 pp.

Peterson T. R. y E. L. Chalif. 2000. Aves de México: Guía de Campo, cuarta edición. Cuarta edición. Editorial Diana, México.

Dunn J. L. y J. Alderfer. 2006. Field guide to the birds of North America. National Geographic. Fifth edition.

Sibley D. A. 2001. The Sibley guide to the birds. National Audubon Society. Alfred A. Knopf New York, USA.

FORMATO DE REGISTRO DE AVISTAMIENTOS

Nombre Científico	Lugar	Fecha	Nota
Aphelocoma ultramarina			
Baeolophus wollweberi			
Basileuterus rufifrons			
Buteo jamaicensis			
Campylorhynchus brunneicapillus			
Cardinalis cardinalis			
Cathartes aura			
Corvus corax			
Cyanocorax yncas			
Cynanthus latirostris			
Dendrocygna autumnalis			
Falco sparverius			
Geococcyx californianus			
Icterus graduacauda			
Megaceryle torquata			
Melanerpes aurifrons			
Melanerpes formicivorus			
Meleagris gallopavo			
Mimus polyglottos			
Mniotilta varia			
Momotus momota			
Myioborus pictus			
Ortalis vetula			
Polioptila caerulea			
Pyrocephalus rubinus			
Regulus calendula			
Rhynchopsitta terrisi			
Toxostoma curvirostre			
Trogon elegans			
Zenaida macroura			