
# Catálogo de aves

En peligro de extinción de las Áreas Naturales Protegidas de la Región Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur.



Vivir Mejor

Protegiendo al medio ambiente construimos los cimientos de un **México próspero para ti y tu familia.**

www.conanp.gob.mx www.semarnat.gob.mx

CONANP
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

GOBIERNO FEDERAL

SEMARNAT

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


## CATÁLOGO DE AVES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE LA REGIÓN FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR, COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.

La Región Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur (RFSIPS), de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), comprende en su territorio la totalidad de la superficie de los estados de Chiapas y Oaxaca, y en una fracción pequeña al estado de Guerrero; sin embargo, es en los dos primeros mencionados en donde se concentra el 57 por ciento de la diversidad de vertebrados terrestres (anfibios, reptiles, aves, mamíferos) de México. Estos dos estados en conjunto representan el 8.5 por ciento de la superficie del país (Oaxaca, 4.8 por ciento y Chiapas, 3.7 por ciento), no obstante en ellos se distribuyen mil 543 especies representadas en ambos estados y de las cuales se comparten hasta en un 63 por ciento. Faunísticamente, las aves son el grupo mejor representado en la región, con 799 especies que equivalen el 52 por ciento de la diversidad de vertebrados terrestres en la RFSIPS y el 75.3 por ciento de las aves de México (mil 60 spp.).

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana-059-Semarnat-2010, de las 799 aves registradas para la RFSIPS, 281 especies se encuentran en alguna categoría de riesgo, y de estas, el 16 por ciento (45 spp.) se consideran en peligro de extinción, compartiendo entre ambos estados hasta el 68.88 por ciento de estas especies.



# Pato real/Muscovy duck




**ORDEN:** *Anseriformes*
**FAMILIA:** *Anatidae*
**GÉNERO:** *Cairina*
**ESPECIE:** *moschata*
**NOMBRE COMÚN:** Pato real
**NOMBRE EN INGLÉS:** Muscovy duck

**HÁBITAT**
En el bosque, en arroyos, estanques, pantanos, ciénegas, manglares, pantanos salobres y lagunas costeras.

**HÁBITOS**
Construye sus nidos en cavidades de árboles, a veces en un terreno de vegetación densa.




**DISTRIBUCIÓN**

# Colibrí oaxaqueño/Blue-capped Hummingbird

**HÁBITAT**
Arbustos en zonas áridas, campos abiertos.

**HÁBITOS**
Son ágiles en el aire, capaces de revolotear y volar hacia atrás, ponen dos huevos blancos, el nido tiene forma de copa, por lo general situado en una rama horizontal.




**DISTRIBUCIÓN**



**ORDEN:** *Apodiformes*
**FAMILIA:** *Trochilidae*
**GÉNERO:** *Eupherusa*
**ESPECIE:** *cyanophrys*
**NOMBRE COMÚN:** Colibrí oaxaqueño
**NOMBRE EN INGLÉS:** Blue-capped Hummingbird

# Cigüeña jabirú/Jabiru



**ORDEN:** *Ciconiiformes*
**FAMILIA:** *Ciconiidae*
**GÉNERO:** *Jabiru*
**ESPECIE:** *mycteria*
**NOMBRE COMÚN:** Cigüeña jabirú
**NOMBRE EN INGLÉS:** Jabiru

**HÁBITAT**
Bosques abiertos húmedos, pantanos, ciénegas y prados húmedos.

**HÁBITOS**
Anida en árboles, acantilados, ponen de tres a cinco huevos blancos y la incubación dura hasta 50 días.




**DISTRIBUCIÓN**


# Tórtola pecho morado/Maroon-chested Ground-Dove

**HÁBITAT**
En los bordes y claros abiertos de los bosques, vegetación secundaria.

**HÁBITOS**
Forrajea sobre el suelo, a menudo bajo matorrales densos en busca de semillas y frutos caídos, tímida y cautelosa.




**DISTRIBUCIÓN**



**ORDEN:** *Columbiformes*
**FAMILIA:** *Columbidae*
**GÉNERO:** *Claravis*
**ESPECIE:** *mondetoura*
**NOMBRE COMÚN:** *Tórtola pecho morado*
**NOMBRE EN INGLÉS:** Maroon-chested Ground-Dove

# Momoto gorgiazul/Blue-throated motmot




**ORDEN:** *Coraciiformes*
**FAMILIA:** *Momotidae*
**GÉNERO:** *Aspatha*
**ESPECIE:** *gularis*
**NOMBRE COMÚN:** Momoto gorgiazul
**NOMBRE EN INGLÉS:** Blue-throated motmot

## HÁBITAT

Habita los bosques de altiplano de encino, pino y ciprés localizados en áreas y hábitats propios del bosque premontano bajo.

## HÁBITOS

Comportamiento tímido y elusivo; perchan en la parte baja de los árboles y en forma silenciosa. Las vocalizaciones de llamada las realiza en la parte superior de los árboles, por lo general en ramas despejadas y sin mucho follaje.




**DISTRIBUCIÓN**

# Momoto piquiancho/Keel-billed motmot

## HÁBITAT

Habita bosques húmedos bajos hasta los 760 metros sobre el nivel del mar, pero en Honduras se pueden encontrar entre los mil 220 a mil 555 metros sobre el nivel del mar.

## HÁBITOS

Se alimenta de insectos, normalmente se encuentra solitaria, pero ocasionalmente se ha visto en pareja.




**DISTRIBUCIÓN**




**ORDEN:** *Coracciiformes*
**FAMILIA:** *Momotidae*
**GÉNERO:** *Electron*
**ESPECIE:** *carinatum*
**NOMBRE COMÚN:** Momoto piquiancho
**NOMBRE EN INGLÉS:** Keel-billed motmot

# Ostrero blanquinegro/American Oystercatcher



**ORDEN:** *Charadriiformes*
**FAMILIA:** *Haematopodidae*
**GÉNERO:** *Haematopus*
**ESPECIE:** *palliatus*
**NOMBRE COMÚN:** Ostrero blanquinegro
**NOMBRE EN INGLÉS:** American Oystercatcher

## HÁBITAT

Islas, costas, rocosos y arenosos, desembocaduras de ríos y estuarios.

## HÁBITOS

Nidos en el suelo en sitios abiertos a menudo en las partes altas de las playas de arena, también entre las rocas, en las islas, en las camas de piedras, de vez en cuando en la marisma.




**DISTRIBUCIÓN**

# Playero rojizo/Red knot

## HÁBITAT


Principalmente en costas, marismas y playas, con menos frecuencia en los pantanos y campos inundados. En las playas de arena o de guijarro, sobre todo en desembocaduras de los ríos.

## HÁBITOS

Duerme en las salinas, anidación a nivel de suelo, principalmente en la tundra estéril o pedregosa. Su dieta consiste predominantemente en insectos, arañas y pequeños crustáceos, anélidos.




**DISTRIBUCIÓN**




**ORDEN:** *Charadriiformes*
**FAMILIA:** *Scolopacidae*
**GÉNERO:** *Calidris*
**ESPECIE:** *canutus*
**NOMBRE COMÚN:** Playero rojizo
**NOMBRE EN INGLÉS:** Red knot

# Águila arpía/Harpy Eagle



**ORDEN:** *Falconiformes*
**FAMILIA:** *Accipitridae*
**GÉNERO:** *Harpia*
**ESPECIE:** *harpyja*
**NOMBRE COMÚN:** Águila arpía
**NOMBRE EN INGLÉS:** Harpy Eagle

**HÁBITAT**
Bosque tropical húmedo (selva alta perennifolia), selvas subperennifolias, selva caducifolia, bosque espinoso y bosque mesófilo de montaña, prefiere las selvas densas que forman grandes extensiones.

**HÁBITOS**
Es una rapaz diurna, suele caer de sorpresa sobre sus presas, cuando está alerta forma un disco facial en la cara y puede elevar su cresta verticalmente al parecer para concentrar los sonidos y aumentar su capacidad auditiva.




**DISTRIBUCIÓN**

# Águila solitaria/Solitary Eagle

**HÁBITAT**
Bosques montañosos espesos con relieve ondulado, de los 600 a los dos mil 800 metros sobre el nivel del mar.

**HÁBITOS**
Se alimenta de aves y serpientes, normalmente solitarios, pero también se observan en pareja.




**DISTRIBUCIÓN**



**ORDEN:** *Falconiformes*
**FAMILIA:** *Accipitridae*
**GÉNERO:** *Harpyhaliaetus*
**ESPECIE:** *solitarius*
**NOMBRE COMÚN:** Águila solitaria
**NOMBRE EN INGLÉS:** Solitary Eagle

# Águila elegante/Ornate Hawk-Eagle



**ORDEN:** *Falconiformes*
**FAMILIA:** *Accipitridae*
**GÉNERO:** *Spizaetus*
**ESPECIE:** *ornatus*
**NOMBRE COMÚN:** Águila elegante
**NOMBRE EN INGLÉS:** Ornate Hawk-Eagle

**HÁBITAT**
Bosques tropicales, húmedos, densos.

**HÁBITOS**
Sus presas consisten principalmente en aves; sin embargo, tambien es predadora de mamíferos pequeños y medianos así como de reptiles. La incubación de sus huevos dura aproximadamente 48 días, y los polluelos abandonan el nido a los dos o tres meses de edad, permaneciendo en sus proximidades durante el primer año.




**DISTRIBUCIÓN**

# Águila tirana/Black Hawk Eagle

**HÁBITAT**
Incluye varios tipos de bosques, preferentemente frescos y húmedos, cercanos a los ríos.

**HÁBITOS**
Las principales presas de esta águila son los mamíferos pequeños y medianos, en ocasiones otras aves.




**DISTRIBUCIÓN**



**ORDEN:** *Falconiformes*
**FAMILIA:** *Accipitridae*
**GÉNERO:** *Spizaetus*
**ESPECIE:** *tyrannus*
**NOMBRE COMÚN:** Águila tirana
**NOMBRE EN INGLÉS:** Black Hawk Eagle

# Águila ventriblanca/Black and white Hawk Eagle



**ORDEN:** *Falconiformes*
**FAMILIA:** *Accipitridae*
**GÉNERO:** *Spizastur*
**ESPECIE:** *melanoleucus*
**NOMBRE COMÚN:** Águila ventriblanca
**NOMBRE EN INGLÉS:** Black and white Hawk Eagle

**HÁBITAT**
En los bordes de áreas boscosas, gustando de zonas abiertas cercanas.

**HÁBITOS**
Es una especie que sus individuos gustan de ser solitarios, se alimenta de aves, reptiles y mamíferos hasta del tamaño de un zorro.




**DISTRIBUCIÓN**

# Zopilote rey/King Vulture

**HÁBITAT**
Principalmente, bosques tropicales de tierras bajas no perturbados, así como sabanas y praderas que se encuentran en las cercanías de estos bosques. A menudo se les puede ver cerca de pantanos o en zonas pantanosas cerca de los bosques.

**HÁBITOS**
Utiliza un mecanismo de urohidrosis para reducir su temperatura corporal, se alimenta de todo tipo de carroña. El Zopilote rey desplaza a los otros buitres que se congregan alrededor de la carroña debido a su gran tamaño y pico fuerte.




**DISTRIBUCIÓN**



**ORDEN:** *Falconiformes*
**FAMILIA:** *Cathartidae*
**GÉNERO:** *Sarcoramphus*
**ESPECIE:** *papa*
**NOMBRE COMÚN:** Zopilote rey
**NOMBRE EN INGLÉS:** King Vulture

# Halcón pechicanelo selvático/Orange breasted falcon




**ORDEN:** *Falconiformes*
**FAMILIA:** *Falconidae*
**GÉNERO:** *Falco*
**ESPECIE:** *deiroleucus*
**NOMBRE COMÚN:** Halcón pechicanelo selvático
**NOMBRE EN INGLÉS:** Orange breasted falcon

## HÁBITAT

Suele encontrarse en hábitat más boscoso que el halcón peregrino.

## HÁBITOS

Depredador con fuertes garras que sirven para apresar a sus víctimas en vuelo.




**DISTRIBUCIÓN**

# Pavón/Horned guan

## HÁBITAT

Bosques húmedos montanos de Chiapas y Guatemala entre los dos mil 500 y tres mil 350 metros sobre el nivel del mar.

## HÁBITOS

Su dieta consiste en frutos, hojas verdes y pequeños invertebrados, toman el agua que se acumula en las plantas epifitas donde habitan, anidan en verano en las partes altas de los árboles, la hembra pone dos huevos que incuba por 35 días.





**DISTRIBUCIÓN**



**ORDEN:** *Galliformes*
**FAMILIA:** *Cracidae*
**GÉNERO:** *Oreophasis*
**ESPECIE:** *derbianus*
**NOMBRE COMÚN:** Pavón
**NOMBRE EN INGLÉS:** Horned guan

# Pajuil/Highland guan




**ORDEN:** *Galliformes*
**FAMILIA:** *Cracidae*
**GÉNERO:** *Penelopina*
**ESPECIE:** *nigra*
**NOMBRE COMÚN:** Pajuil
**NOMBRE EN INGLÉS:** Highland guan

## HÁBITAT
Bosques húmedos montañosos de México.

## HÁBITOS
Se caracteriza por el dimorfismo sexual, el macho es negro y brillante en el dorso y las alas, y pardo oscuro en el vientre, en tanto que la hembra es castaño barrado en negro con la cola más oscura, el pico y garganta son de color rojo.




**DISTRIBUCIÓN**

# Codorniz cotuí/Northern Bobwhite

## HÁBITAT
Sabanas, pastizales y campos cultivados con alguna espesura densa cercana.

## HÁBITOS
Anidan de abril a julio, construyen su nido con pajas en alguna depresión del suelo protegida por arbustos, llegando a poner hasta 18 huevos en algunos casos.





**DISTRIBUCIÓN**



**ORDEN:** *Galliformes*
**FAMILIA:** *Odontophoridae*
**GÉNERO:** *Colinus*
**ESPECIE:** *virginianus*
**NOMBRE COMÚN:** Codorniz cotuí
**NOMBRE EN INGLÉS:** Northern Bobwhite

# Codorniz coluda veracruzana/Bearded Wood Partidge



**ORDEN:** *Galliformes*
**FAMILIA:** *Odontophoridae*
**GÉNERO:** *Dendrortyx*
**ESPECIE:** *barbatus*
**NOMBRE COMÚN:** Codorniz coluda veracruzana
**NOMBRE EN INGLÉS:** Bearded Wood Partidge

## HÁBITAT

Zonas montañosas templadas y frías, bosques de niebla y laderas poco accesibles.

## HÁBITOS

Es un ave sigilosa y escurridiza difícil de observar, es más fácil detectarla por su canto, terrestre, únicamente percha en los árboles para pasar la noche, anida en el suelo poniendo de cuatro a seis huevos con marcas cafés.




**DISTRIBUCIÓN**

# Ave sol/Sunbittern

## HÁBITAT

Arroyos de zonas boscosas a no más de 900 metros sobre el nivel del mar.

## HÁBITOS

Forrajean a lo largo de la orilla de los cuerpos de agua corriente en busca de pequeños crustáceos, insectos o pequeñas larvas y peces, cazan en silencio con los cuerpos inclinados, cuando se sienten amenazados vuelan a refugiarse en las ramas de los árboles.




**DISTRIBUCIÓN**



**ORDEN:** *Gruiformes*
**FAMILIA:** *Eurypydae*
**GÉNERO:** *Eurypyga*
**ESPECIE:** *helias*
**NOMBRE COMÚN:** Ave sol
**NOMBRE EN INGLÉS:** Sunbittern

# Chara guerrerense/Chara guerrerense



**ORDEN:** *Passeriformes*
**FAMILIA:** *Corvidae*
**GÉNERO:** *Cyanolyca*
**ESPECIE:** *mirabilis*
**NOMBRE COMÚN:** Chara guerrerense
**NOMBRE EN INGLÉS:** Chara guerrerense

## HÁBITAT

Bosques de pino-encino en tierras altas, hasta los tres mil 300 metros sobre el nivel del mar.

## HÁBITOS

Construye su nido con ramas pequeñas que coloca en los árboles o arbustos; sin embargo, también pueden anidar dentro de huecos, su alimentación es omnívora.




**DISTRIBUCIÓN**

# Chara enana/Dwarf Jay

## HÁBITAT

En asociaciones de bosques húmedos montanos, siendo más abundante en pino-encino-pino.

## HÁBITOS

Generalmente en pareja o grupos numerosos, se alimenta de insectos, frutas, huevos y en ocasiones de polluelos, nidifican en algunos agujeros de árboles.




**DISTRIBUCIÓN**



**ORDEN:** *Passeriformes*
**FAMILIA:** *Corvidae*
**GÉNERO:** *Cyanolyca*
**ESPECIE:** *nana*
**NOMBRE COMÚN:** Chara enana
**NOMBRE EN INGLÉS:** Dwarf Jay

# Trepador gigante/Strong billed woodcreeper



**ORDEN:** *Passeriformes*
**FAMILIA:** *Dendrocolaptidae*
**GÉNERO:** *Xiphocolaptes*
**ESPECIE:** *promeropirhynchus*
**NOMBRE COMÚN:** Trepador gigante
**NOMBRE EN INGLÉS:** Strong billed woodcreeper

**HÁBITAT**
Bosques montañosos de árboles altos, en las selvas húmedas.

**HÁBITOS**
Forrajean sobre los troncos y ramas gruesas, tanto cerca del suelo como de niveles intermedios, pueden ser solitarios o formar parejas, son silenciosos.




**DISTRIBUCIÓN**

# Gorrión oaxaqueño ístmico/Cinnamon tailed sparrow

**HÁBITAT**
En la zona mediana y baja de la vertiente del Pacífico del Istmo de Tehuantepec, desde el río Tehuantepec en Oaxaca, hacia el oeste de Chiapas con una preferencia de hábitat por los matorrales bajos y los bosques espinosos.

**HÁBITOS**
Se diferencia de otro gorriones del género por la presencia de dos rayas a manera de bigote doble a cada lado, extendiéndose de la mandíbula inferior a la cabeza.




**DISTRIBUCIÓN**



**ORDEN:** *Passeriformes*
**FAMILIA:** *Emberizidae*
**GÉNERO:** *Aimophila*
**ESPECIE:** *sumichrasti*
**NOMBRE COMÚN:** Gorrión oaxaqueño ístmico
**NOMBRE EN INGLÉS:** Cinnamon tailed sparrow

# Semillerito unicolor/Blue Seedeater




**HÁBITAT**
Bosques de montaña entre los mil y dos mil metros sobre el nivel del mar.

**HÁBITOS**
Se asocia al bambú de cuyos brotes se alimenta, su nido lo construye en la parte más basal de las ramas cercanas al tallo principal.

**ORDEN:** *Passeriformes*
**FAMILIA:** *Emberizidae*
**GÉNERO:** *Amaurospiza*
**ESPECIE:** *concolor*
**NOMBRE COMÚN:** Semillerito unicolor
**NOMBRE EN INGLÉS:** Blue Seedeater




**DISTRIBUCIÓN**

# Pinzón mexicano/House finch

**HÁBITAT**
Variado, pueblos, ranchos, bosques abiertos, arbustos, zonas costeras, cañones, desiertos.

**HÁBITOS**
Se alimenta de insectos, flores, frutos y brotes, anida habitualmente en árboles y arbustos, poniendo de dos a seis huevos azulados con marcas color marrón.




**DISTRIBUCIÓN**



**ORDEN:** *Passeriformes*
**FAMILIA:** *Fringillidae*
**GÉNERO:** *Carpodacus*
**ESPECIE:** *Mexicanus*
**NOMBRE COMÚN:** Pinzón mexicano
**NOMBRE EN INGLÉS:** House finch

# Chipe mejillas amarillas/Golden cheeked-warbler



**ORDEN:** *Passeriformes*
**FAMILIA:** *Parulidae*
**GÉNERO:** *Dendroica*
**ESPECIE:** *chrysoparia*
**NOMBRE COMÚN:** Chipe mejillas amarillas
**NOMBRE EN INGLÉS:** Golden cheeked-warbler

**HÁBITAT**
Áreas boscosas de pinos y encinos.

**HÁBITOS**
Se alimenta de insectos, larvas y arañas pequeñas, construye su nido elaborado a partir de cortezas y telaraña, ponen de 3 a 4 huevos.




**DISTRIBUCIÓN**

# Chipe rosado/Pink headed warbler

**HÁBITAT**
Residente de las montañas del centro y el extremo sureste de Chiapas, Volcán Tacaná, en hábitat húmedos a semihúmedos, de pino-encino, pino.

**HÁBITOS**
Migratoria. Se alimenta de insectos, larvas y arañas pequeñas. Construye su nido elaborado a partir de cortezas y telaraña, ponen de 3 a 4 huevos.





**DISTRIBUCIÓN**




**ORDEN:** *Passeriformes*
**FAMILIA:** *Parulidae*
**GÉNERO:** *Ergaticus*
**ESPECIE:** *versicolor*
**NOMBRE COMÚN:** Chipe rosado
**NOMBRE EN INGLÉS:** Pink headed warbler

# Tangara chiapaneca/Azure rumped tanager




**ORDEN:** *Passeriformes*
**FAMILIA:** *Tharupidae*
**GÉNERO:** *Tangara*
**ESPECIE:** *cabanisi*
**NOMBRE COMÚN:** Tangara chiapaneca
**NOMBRE EN INGLÉS:** Azure rumped tanager

## HÁBITAT

En bosques húmedos de hoja ancha, perenne entre los mil y mil 700 metros sobre el nivel del mar en la Sierra Madre de Chiapas, es conocida en cinco localidades, pero los únicos registros recientes son de la Reserva de la Biosfera El Triunfo.

## HÁBITOS

Se alimenta en los estratos superiores y el dosel de los árboles, se reproduce en la temporada de lluvia.




## DISTRIBUCIÓN

# Cuevero de nava/Nava's wren

## HÁBITAT

En el extremo oriental de Veracruz, en el punto medio del Istmo de Tehuantepec, se limita a afloramientos de roca caliza en la sombra de los bosques primarios siempre verdes.

## HÁBITOS

Se alimenta de invertebrados de la superficie de las cubiertas de líquenes de las piedras y en las grietas y hendiduras de las rocas.




## DISTRIBUCIÓN



**ORDEN:** *Passeriformes*
**FAMILIA:** *Troglodytidae*
**GÉNERO:** *Hylorchilus*
**ESPECIE:** *navai*
**NOMBRE COMÚN:** Cuevero de nava
**NOMBRE EN INGLÉS:** Nava's wren

# Mosquero real/Royal flycatcher




**ORDEN:** *Passeriformes*
**FAMILIA:** *Tyrannidae*
**GÉNERO:** *Onychorhynchus*
**ESPECIE:** *coronatus*
**NOMBRE COMÚN:** Mosquero real
**NOMBRE EN INGLÉS:** Royal flycatcher

## HÁBITAT

Bosques de galería, al interior y bordes de bosques densos, barrancos, bosques secundarios viejos y áreas semiabiertas.

## HÁBITOS

El macho tiene un penacho en forma de abanico que al desplegarse muestra plumas rojas con bordes superiores negros, matices azules y motas negras, en las hembras el rojo se sustituye por amarillo-anaranjado.




**DISTRIBUCIÓN**

# Vireo gorra negra/Black capped vireo

## HÁBITAT

En matorrales de encino y estribaciones de montañas con arbustos.

## HÁBITOS

Construye su nido de forma cóncava o en forma de bolsa, suspendido de las ramas en una horquilla, de dos a cinco huevos blancos con manchas marrones.





**DISTRIBUCIÓN**



**ORDEN:** *Passeriformes*
**FAMILIA:** *Vireonidae*
**GÉNERO:** *Vireo*
**ESPECIE:** *atricapilla*
**NOMBRE COMÚN:** Vireo gorra negra
**NOMBRE EN INGLÉS:** Black capped vireo

# Vireo de Bell/Bell's vireo



**ORDEN:** *Passeriformes*
**FAMILIA:** *Vireonidae*
**GÉNERO:** *Vireo*
**ESPECIE:** *bellii*
**NOMBRE COMÚN:** Vireo de Bell
**NOMBRE EN INGLÉS:** Bell's vireo

**HÁBITAT**
Frecuenta densa vegetación baja, arbustiva, orillas de arroyos, sauces, mezquites y vegetación secundaria en selvas tropicales.

**HÁBITOS**
Se alimenta de insectos, construye su nido en forma de bolsa, suspendido de las ramas en una horquilla.




**DISTRIBUCIÓN**

# Pardela de Revillagigedo/Townsend's Shearwater

**HÁBITAT**
Ave marina de hábitat pelágico, en aguas próximas del archipiélago de hawaiano y aguas cerca de la Costa de México.

**HÁBITOS**
Construye sus nidos en madrigueras en las islas oceánicas, Islas de Revillagigedo, llega a medir 35cm de longitud y las alas una envergadura de 89cm.




**DISTRIBUCIÓN**



**ORDEN:** *Passeriformes*
**FAMILIA:** *Procellariidae*
**GÉNERO:** *Puffinus*
**ESPECIE:** *auricularis*
**NOMBRE COMÚN:** Pardela de Revillagigedo
**NOMBRE EN INGLÉS:** Townsend's Shearwater

# Loro nuquiamarillo/Yellow naped Parrot



**ORDEN:** *Psittaciformes*
**FAMILIA:** *Psittacidae*
**GÉNERO:** *Amazona*
**ESPECIE:** *auropalliata*
**NOMBRE COMÚN:** Loro nuquiamarillo
**NOMBRE EN INGLÉS:** Yellow naped Parrot

## HÁBITAT

Selvas tropicales entre el sur de México y norte de América Central. Viven en el dosel y bordes de los bosques deciduos y de galería y sabanas con árboles aislados.

## HÁBITOS

Se alimenta de semillas y frutas, anidan en cavidades naturales sin revestimiento, tales como huecos en troncos viejos o muertos, generalmente ponen 3 huevos durante la estación seca.




**DISTRIBUCIÓN**

# Loro coroniazul/Mealy Parrot

## HÁBITAT

Bosques húmedos, tierras boscosas y ecotono de bosques.

## HÁBITOS

Se le puede ver en pareja o en pequeños grupos que tienden a volar alto desde sus sitios de descanso a los de alimentación. Suele anidar en cavidades de árboles, pone hasta ocho huevos blancos.




**DISTRIBUCIÓN**



**ORDEN:** *Psittaciformes*
**FAMILIA:** *Psittacidae*
**GÉNERO:** *Amazona*
**ESPECIE:** *farinosa*
**NOMBRE COMÚN:** Loro coroniazul
**NOMBRE EN INGLÉS:** Mealy Parrot

# Loro corona lila/Lilac crowned parrot



**ORDEN:** *Psittaciformes*
**FAMILIA:** *Psittacidae*
**GÉNERO:** *Amazona*
**ESPECIE:** *finschi*
**NOMBRE COMÚN:** Loro corona lila
**NOMBRE EN INGLÉS:** Lilac crowned parrot

## HÁBITAT

Bosque caducifolio, bosque de pino-encino, a lo largo de la costa pacífica desde el sur de Sonora y Chihuahua al suroeste de Oaxaca.

## HÁBITOS

Baja tolerancia a perturbaciones humanas, la estacionalidad juega un papel importante en la historia de vida de la especie, ya que puede desencadenar migraciones altitudinales y latitudinales y afectar la actividad diaria.




**DISTRIBUCIÓN**

# Loro coroniamarillo/Yellow headed parrot

## HÁBITAT

Habita en bosques densos de espinas, sabanas, bosques deciduos altos y húmedos ribereños, bosque caducifolio, crestas de pino, áreas suburbanas.

## HÁBITOS

Anida en cavidades de árboles y tocones entre febrero y junio, se alimenta de frutas de árboles silvestres y cultivadas.




**DISTRIBUCIÓN**



**ORDEN:** *Psittaciformes*
**FAMILIA:** *Psittacidae*
**GÉNERO:** *Amazona*
**ESPECIE:** *oratrix*
**NOMBRE COMÚN:** Loro coroniamarillo
**NOMBRE EN INGLÉS:** Yellow headed parrot

# Guayamaya roja/Scarlet Macaw




**ORDEN:** *Psittaciformes*
**FAMILIA:** *Psittacidae*
**GÉNERO:** *Ara*
**ESPECIE:** *macao*
**NOMBRE COMÚN:** Guayamaya roja
**NOMBRE EN INGLÉS:** Scarlet Macaw

**HÁBITAT**
Selva alta siempre verde.

**HÁBITOS**
Solo o en parejas, en algunos lugares todavía pueden verse por bandadas de hasta 20 individuos, se alimentan de frutas, semillas, nueces y néctar.




**DISTRIBUCIÓN**

# Guacamaya verde/Military Macaw

**HÁBITAT**
Bosques deciduos de montañas, zonas áridas y semiáridas, cañadas.

**HÁBITOS**
Se le ve volando en parejas o grupos, suele comer frutos y semillas tóxicos, por lo que recurre a lamederos de neutralizantes naturales como la arcilla para desintoxicarse. Anida en cavidades de los árboles o grietas en rocas.




**DISTRIBUCIÓN**



**ORDEN:** *Psittaciformes*
**FAMILIA:** *Psittacidae*
**GÉNERO:** *Ara*
**ESPECIE:** *militaris*
**NOMBRE COMÚN:** Guacamaya verde
**NOMBRE EN INGLÉS:** Military Macaw

# Loro cabecioscuro/Brown hooded parrot



**ORDEN:** *Psittaciformes*
**FAMILIA:** *Psittacidae*
**GÉNERO:** *Pionopsitta*
**ESPECIE:** *haematotis*
**NOMBRE COMÚN:** Loro cabecioscuro
**NOMBRE EN INGLÉS:** Brown hooded parrot

## HÁBITAT
Bosques húmedos.

## HÁBITOS
Se le puede ver en pareja o pequeños grupos, rara vez de más de 20 individuos, su vuelo es rápido y directo, suele anidar en cavidades de árboles, pone de uno a ocho huevos blancos, se alimenta de frutos y semillas.




**DISTRIBUCIÓN**

# Tecolote abetero sureño/Unspotted saw-whet owl

## HÁBITAT
Dosel y bordes de los bosques, claros y pastizales con árboles abiertos y aislados, tanto en los robledales de las montañas altas, como en los bosques montanos y nubosos un poco más bajos.

## HÁBITOS
Se reproduce en la estación seca y comienzos de la lluviosa, sus presas principales son roedores pequeños y musarañas suplementados con aves y murciélagos.




**DISTRIBUCIÓN**



**ORDEN:** *Strigiformes*
**FAMILIA:** *Strigidae*
**GÉNERO:** *Aegolius*
**ESPECIE:** *ridgwayi*
**NOMBRE COMÚN:** Tecolote abetero sureño
**NOMBRE EN INGLÉS:** Unspotted saw-whet owl

# Tecolote grillo/Bearded screech owl



**ORDEN:** *Strigiformes*
**FAMILIA:** *Strigidae*
**GÉNERO:** *Megascops*
**ESPECIE:** *barbarus*
**NOMBRE COMÚN:** Tecolote grillo
**NOMBRE EN INGLÉS:** Bearded screech owl

## HÁBITAT

Bosque subtropical y subhúmedo montano, pino-encino, desde las tierras altas del Istmo de Tehuantepec en el sureste de México.

## HÁBITOS

Se alimenta de insectos grandes. Su llamado es un trino corto y rápido, su volumen aumenta al principio y al final cae abruptamente.




**DISTRIBUCIÓN**

# Búho serrano sureño/Fulvous Owl

## HÁBITAT

Bosques templados subtropicales y bosques húmedos montanos tropicales, desde los mil 200 hasta los tres mil metros sobre el nivel del mar.

## HÁBITOS

Nocturna y crepuscular, se alimenta de pequeños vertebrados e insectos, anida en huecos de árboles y la puesta suele tener de dos a tres huevos.




**DISTRIBUCIÓN**



**ORDEN:** *Strigiformes*
**FAMILIA:** *Strigidae*
**GÉNERO:** *Strix*
**ESPECIE:** *fulvescens*
**NOMBRE COMÚN:** Búho serrano sureño
**NOMBRE EN INGLÉS:** Fulvous Owl

# Quetzal centroamericano/Resplendent quetzal



**ORDEN:** *Trogoniformes*
**FAMILIA:** *Trogonidae*
**GÉNERO:** *Pharomachrus*
**ESPECIE:** *mocinno*
**NOMBRE COMÚN:** Quetzal centroamericano
**NOMBRE EN INGLÉS:** Resplendent quetzal

## HÁBITAT
Bosque de niebla.

## HÁBITOS
En el vuelo el macho ondula y vibra su larga cola, también durante el cortejo nupcial aéreo, el apareamiento se realiza en los meses de febrero a marzo, construyen su nido en los huecos de los árboles donde la hembra pone los huevos de color azul claro, la incubación es realizada entre ambos.




## DISTRIBUCIÓN

Ilustraciones: CONABIO



Conanp (Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas).
Camino al Ajusco No. 200, 3er. piso
Tlalpan, México, D.F. C.P. 14210
Tels: 01(55)5449 7009/03

Oficina regional
Palacio Federal 3er. piso
2a. Oriente Norte No. 227
Col. Centro, C.P. 29000
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Tel: 01 (961) 61 310 84 /6133787

**Síguenos** a través de  Conanp-Dirección Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur