



Mariposa Monarca



Categoría de Manejo: Reserva de la Biosfera

Ubicación: Estados - Michoacán, Estado de México

Municipios - Contepec, Senguio, Angangueo, Aporo, Ocampo, Zitacuaro, Temascalcingo, San Jose del Rincon, Villa de Allende, Donato Guerra

Región CONANP: Centro y Eje Neovolcánico

Institución que Administra: CONANP

Encargado del despacho: Ing. Amado Fernández Islas

Superficie Total: 56,259.05 ha

Superficie Terrestre y/o Aguas Continentales: 56,259.05 ha

Continetales:

Superficie Marina: 0.00 ha

Población Total Estimada: 27,346 hab.

Población Indígena: 644 hab.

Fecha de Decreto: 10/11/2000

Fecha de Modificación y/o de Decreto: 03/11/2009

Fecha de Recategorización y/o: 07/06/2000

Programa de Manejo: Resumen DOF 30/04/2001

Registro en SINAP: Certificado

Aviso DOF

Designaciones Internacionales:

[World Heritage - Patrimonio Mundial](#)



MaB - Hombre y Biosfera

Tipos de Vegetación:

- Bosque de Coníferas
- Bosque de Encino
- Vegetación inducida

Especies representativas:

- Flora: Pino ortiguillo (*Pinus pseudostrobus*), Pino de las alturas (*Pinus hartwegii*), Pino colorado, teocote (*Pinus teocote*), Pino amarillo (*Pinus oocarpa*), Encino, encino jarrillo (*Quercus laurina*), Aile (*Alnus jorullensis*), Sauce (*Salix paradoxa*), Capulín (*Prunus sp.*), Pino lacio, pino real, ocote (*Pinus devoniana*)
- Fauna: Lince (*Lynx rufus*), Coyote (*Canis latrans*), Zorrillo listado del sur (*Mephitis macroura*), Venado cola blanca (*Odocoileus virginianus*)

Especies Microendémicas:

- Víbora cascabel transvolcánica (*Crotalus triseriatus*)

Especies Endémicas:

- Ageratina oligocephala (*Ageratina oligocephala*), Colibrí berilo (*Amazilia berillyna*), Siredon de Toluca (*Ambystoma rivularis*), Rascador cejas verdes (*Arremon virenticeps*), Rascador gorra canela (*Atlapetes pileatus*), Zumbador Mexicano (*Atthis heloisa*), Escobilla (*Baccharis multiflora*), Rascador cejas verdes (*Arremon virenticeps*), Tepozán Cimarrón (*Buddleja parviflora*), Matraca serrana (*Campylorhynchus gularis*), Matraca barrada (*Campylorhynchus megalopterus*), Culebra mexicana dos líneas, culebra terrestre dos líneas (*Conopsis biserialis*), Chipe rojo (*Cardellina rubra*), Zorzal mexicano (*Catharus occidentalis*), Yaga-yana (*Comarostaphylis discolor*), Rana ladradora de Smith (*Craugastor hobartsmithi*), Musaraña orejillas de goldman (*Cryptotis goldmani*), Codorniz coluda transvolcánica (*Dendrortyx macroura*), Coyamol (*Echeandia flavescens*), Mapache de las islas Marías (*Procyon lotor subsp. insularis*), Flor de güegüeche (*Gentiana spathacea*), Rana de árbol de montaña (*Hyla eximia*), Rana de árbol plegada o surcada (*Hyla plicata*), Calandria flancos negros (*Icterus abeillei*), Cuatlotlanenzi (*Iostephane heterophylla*), Enebro azul (*Juniperus monticola*), Trepatroncos Mexicano (*Lepidocolaptes leucogaster*), Rana neovolcanica (*Lithobates neovolcanicus*), Mulato azul (*Melanotis caerulescens*), Momoto corona canela (*Momotus mexicanus*), Rata cambalachera, rata cambalachera diminuta, rata monterera (*Nelsonia neotomodon*), Chipe cejas blancas (*Oreothlypis superciliosa*), Zacatonero Serrano (*Oriturus superciliosus*), Codorniz barrada (*Philortyx fasciatus*), Pino piñonero (*Pinus cembroides*), Pino blanco (*Pinus martinezii*), Piranga cabeza roja (*Piranga erythrocephala*), Tlaconete Pinto (*Pseudoeurycea belli*), Tlaconete Cola Larga (*Pseudoeurycea longicauda*), Rana de Moctezuma (*Rana montezumae*), Rana manchada (*Rana spectabilis*), Culebra acotera, culebra café coronada, culebra de collar, hojarasquera corona (*Rhadinaea laureata*), Mirlo azteca (*Ridgwayia pinicola*), Hediondilla (*Roldana lineolata*), Culebra chata de Baird, culebra parchada de Baird, culebra rayada (*Salvadora bairdi*), Lagartija escamosa barrada, lagartija espinosa de collar (*Sceloporus torquatus*), Culebra parda



mexicana (*Storeria storerioides*), Vencejo Nuca Blanca (*Streptoprocne semicollaris*), Culebra listonada de montaña cola larga (*Thamnophis scalaris*), Salta pared feliz (*Thryothorus felix*), Tilia mexicana (*Tilia longipes*), Saltapared cola larga (*Tryomanes bewickii*), Mirlo dorso canela (*Turdus rufopalliatus*), Vireón alerquín (*Vireolanlus melitophrys*), Mosquero del balsas (*Xenotriccus mexicanus*), Abeto (*Abies religiosa*), Serpiente coralillo del occidente mexicano (*Micrurus distans*), (*Psacalium megaphyllum*), (*Quercus martinezii*), Culebra café de pino encino (*Rhadinaea taeniata*), Lirio (*Rhynchosstele cervantesii*), (*Sedum minimum*), (*Senecio stoechadiformis*), (*Senecio toluccanus*), Chayotito (*Sicyos deppei*), Memelilla (*Verbesina oncophora*)

Tasa de Transformación de las Cubiertas Forestales del ANP:

Periodo	Tasa de Transformación (%)	Hectáreas por Año	Valoración de Tasa	Año de Reporte
1976-2000	0.66	332	Pérdida	2003
2000-2008	0.8	86	Pérdida	2010
2001-2012	0.35	153	Pérdida	2012