



Zicuirán - Infiernillo



Categoría de Manejo: Reserva de la Biosfera

📍 Ubicación: Estado - Michoacán

Municipios - Arteaga, Churumuco, La Huacana,
Tumbiscatio

Región CONANP: Occidente y Pacífico Centro

Institución que Administra: CONANP

Subdirector encargado del Área: Dr. Hugo Zepeda Castro

📍 Superficie Total: 265,117.78 ha

Superficie Terrestre y/o Aguas 265,117.78 ha
Continetales:

Superficie Marina: 0.00 ha

Población Total Estimada: 11,944 hab.

Población Indígena: 43 hab.

Fecha de Decreto: 30/11/2007 📄

Programa de Manejo: Resumen DOF 06/11/2013 📄

Registro en SINAP: Certificado 📄

Aviso DOF 📄

Tipos de Vegetación:

- Bosque de Encino
- Selva Caducifolia
- Selva Espinosa



- Vegetación inducida

Especies representativas:

• Flora: Cuachalalate (*Amphipterygium adstringens*), Botija (*Cochlospermum vitifolium*), Tetlate (*Pseudosmodingium perniciosum*), Ciruela de hueso (*Spondias purpurea*), Véase Cascabela ovata (*Thevetia ovata*), Cacaloxúchil, cacaloxúchitl (*Plumeria rubra*), Candelilla (*Euphorbia schlechtendalii*), Llorasangre (*Apoplanesia paniculata*), Pellejo de toro (*Piscidia carthagenensis*), Alfaje (*Trichilia* spp.), Amapa (*Handroanthus impetiginosus*), (*Manihot tomatophylla*), Sangregado (*Jatropha stephanii*), (*Euphorbia colletioides*)

• Fauna: Tamandúa norteño (*Tamandua mexicana*), Venado cola blanca (*Odocoileus virginianus*), Lince (*Lynx rufus*), Jaguarundi, leoncillo (*Puma yagouaroundi*), Zorra gris, zorra (*Urocyon cinereoargenteus*), Coyote (*Canis latrans*), Nutria de río (*Lontra longicaudis*), Martucha o mico nocturno (*Potos flavus*), Lagartija (*Ctenosaura clarkii*)

Especies Microendémicas:

- ()

Especies Endémicas:

• Zacatonero Pecho Negro (*Peucea humeralis*), Colibrí berilo (*Amazilia berillyna*), Loro Corona Lila (*Amazona finschi*), Abaniquillo Oaxaqueño (*Anolis nebuloides*), Murciélago frutero peludo (*Artibeus hirsutus*), Ticuiliche (*Aspidoscelis calidipes*), Huico moteado gigante (*Aspidoscelis communis*), Huico llanero (*Aspidoscelis costata*), Cuiji de muchas líneas (*Aspidoscelis lineatissima*), órgano de gorro tiponche (*Backebergia militaris*), Barkeria de shoemaker (*Barkeria shoemakeri*), Lagartija topo cuatro dedos (*Bipes canaliculatus*), Rascador cejas verdes (*Arremon vrenticeps*), Copal (*Bursera coyucensis*), Casique mexicano (*Cassiculus melanicterus*), Matraca serrana (*Campylorhynchus gularis*), Esmeralda occidental (*Chlorostilbon auriceps*), Víbora cascabel de Saye (*Crotalus basiliscus*), Iguana espinosa mexicana (*Ctenosaura pectinata*), Colibrí opaco (*Cyanthus sordidus*), Papamoscas mexicano (*Deltarhynchus flammulatus*), Nopilchi (*Ctenosaura clarki*), Murciélago lengüetón de Xiutepec (*Glossophaga morenoi*), Granatelo mexicano (*Granatellus venustus*), Rata cambalachera de Allen (*Hodomys allenii*), Excelso (*Jatropha galvanii*), Piñón (*Jatropha stephani*), Anís (*Karwinskia johnstonii*), Casquito de burro, tortuga pecho quebrado Mexicana (*Kinosternon integrum*), Culebra ojo de gato del Suroeste (*Leptodeira maculata*), Culebra perico gargantilla (*Leptophis diplotropis*), Ziix hax ano quiij (*Lithobates pustulosus*), Palo de corral (*Lonchocarpus huetamoensis*), Tecolote del Balsas (*Megascops seductus*), Carpintero enmascarado (*Melanerpes chrysogenys*), Momoto corona canela (*Momotus mexicanus*), Rata arrocera (*Osgoodomys banderanus*), Lis-na-uo-she (*Pachycereus tepamo*), Ratón espiguero (*Peromyscus spicilegus*), Codorniz barrada (*Philortyx fasciatus*), Colorín pecho naranja, colorín vetridorado (*Passerina leclancherii*), Lagarto cornudo (*Phrynosoma asio*), Salamanesca Pata de Res (*Phyllodactylus lanei*), Salamanesca de Cabo San Lucas (*Phyllodactylus unctus*), Culebra de cabeza roja, sapera (*Pseudoleptodeira latifasciata*), Culebra café de occidente (*Rhadinaea hesperia*), Tortuga de Monte Payaso (*Rhinoclemmys rubida*), Murciélago amarillo mayor (*Rhogeessa alleni*), Murciélago amarillo de infiernillo (*Rhogeessa mira*), Cuijera (*Salvadora mexicana*), Lagartija de las rovas (*Sceloporus gadoviae*), Roño de Árbol (*Sceloporus melanorhinus*), Lagartija-espinosa de pedregal (*Sceloporus pyrocephalus*), Espinosa, lagartija escamuda, lagartija espinosa mexicana (



Sceloporus spinosus), Rata hispida Jalisciense (*Sigmodon mascotensis*), Vencejo Nuca Blanca (*Streptoprocne semicollaris*), Conejo (*Sylvilagus cunicularius*), Culebra-ciempiés del litoral del Pacífico (*Tantilla calamarina*), Salta pared feliz (*Thryothorus felix*), Palmita-hierba del pollo (*Tradescantia orchidophylla*), Falsa nauyaca mexicana (*Trimorphodon tau*), Coa citrina (*Trogon citreolus*), Mirlo dorso canela (*Turdus rufopalliatu*), Vireo amarillo (*Vireo hypochryseus*), Sardinita Agua Dulce (*Lile gracilis*), Palo prieto (*Mimosa rosei*), Miotis canelo (*Myotis fortidens*), (*Opizia bracteata*), (*Otus seductus*), Colorín morado (*Passerina versicolor*), (*Pectis decemcarinata*), Ratón pantanero (*Peromyscus perfulvus*), Salamanesca pigmea de la sierra madre del sur (*Phyllodactylus duellmani*), Salamanesca de río marqués (*Phyllodactylus paucituberculatus*), (*Pavonia oxyphylla*), Managuatillo (*Rhacoma managuatillo*), Palma real (*Sabal pumos*), (*Senecio stoechadiformis*), Rata de la caña del pacífico (*Sigmodon allenii*), Culebra de tierra de Michoacán (*Sonora michoacanensis*), Ardilla terrestre (*Spermophilus annulatus*), Baboso (*Stenocereus quevedonis*), (*Stevia trifida*), Amapola (*Tabebuia palmeri*), Lagartija de árbol del pacífico (*Urosaurus bicarinatus*)

Tasa de Transformación de las Cubiertas Forestales del ANP:

Periodo	Tasa de Transformación (%)	Hectáreas por Año	Valoración de Tasa	Año de Reporte
1999-2008	0.1	231	Pérdida	2010