



Categoría de Manejo: Reserva de la Biosfera

📍 Ubicación: Estado - Quintana Roo

Municipios - Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad,
Bacalar

Región CONANP: Península de Yucatán y Caribe Mexicano

Institución que Administra: CONANP

📍 Superficie Total: 528,147.66 ha

Superficie Terrestre y/o Aguas 375,011.87 ha
Continetales:

Superficie Marina: 153,135.79 ha

Población Total Estimada: 634 hab.

Población Indígena: 202 hab.

Fecha de Decreto: 20/01/1986 📄

Fecha de Recategorización: 07/06/2000 📄

Programa de Manejo: Resumen DOF 23/01/2015 📄

Registro en SINAP: Certificado 📄

Aviso DOF 📄

Designaciones Internacionales:

[Sitio RAMSAR - 1329 Convención de Humedales](#)

[World Heritage - Patrimonio Mundial](#)



MaB - Hombre y Biosfera

Tipos de Vegetación:

- Selva Espinosa
- Selva Perennifolia
- Selva Subcaducifolia
- Sin Vegetación Aparente
- Vegetación de Dunas Costeras
- Vegetación Hidrófila
- Manglar

Especies representativas:

•Flora: Chechem negro (*Metopium brownei*), Chicozapote (*Manilkara zapota*), Chaca o palo mulato, palo chaca (*Bursera simaruba*), Dzalam (*Lysiloma latisiliquum*), (*Nectandra spp.*), Nance (*Byrsonima bucidaefolia*), (*Caesalpinia gaumeri*), Habin (*Piscidia piscipula*), Guayabillo (*Piscidium sartorianum*), Ya'xnik (*Vitex gaumeri*), Despeinada (*Beaucarnea ameliae*), Palma kuka (*Pseudophoenix sargentii*), Pucte (*Bucida buceras*), Tinte (*Haematoxylon campechianum*)

•Fauna: Jaguar (*Panthera onca*), Puma (*Puma concolor*), Ocelote (*Leopardus pardalis*), Tigrillo (*Leopardus wiedii*), Jaguarundi, leoncillo (*Puma yagouaroundi*), Tapir (*Tapirus bairdii*), Saraguato de manto (*Alouatta pigra*), Venado cola blanca (*Odocoileus virginianus*), Venado cabrito (*Mazama americana*), Pecari de labios blancos (*Tayassu pecari*), Pecari de collar (*Pecari tajacu*), Sereque, guaunque (*Dasyprocta punctata*), Viejo de monte (*Eira barbara*), Tamandúa (*Tamandua tetradactyla*), Martucha o mico nocturno (*Potos flavus*), Manati (*Trichechus manatus*), Ibis blanco (*Eudocimus albus*), Espátula rosada (*Ajaia ajaja*), Flamenco (*Phoenicopterus ruber*), Cigüeña jabirú (*Jabiru mycteria*), Tortuga verde o prieta (*Chelonia mydas*), Tortuga caguama (*Caretta caretta*), Tortuga carey (*Eretmochelys imbricata*), Cocodrilo americano (*Crocodylus acutus*), Cocodrilo de pantano (*Crocodylus moreletii*), Tepezcuintle (*Cuniculus paca*)

Especies Endémicas:

• Loro yucateco (*Amazona xantholora*), Lagartija picasombra (*Aspidoscelis cozumela*), Th'llib tuux (*Ayenia fasciculata*), jóol, k'an jóol (*Bakeridesia gaumeri*), Bakalché (*Bourreria pulchra*), Grosella (*Byrsonima bucidifolia*), Matraca yucateca (*Campylorhynchus yucatanicus*), Tok'Abam (*Chromolaena lundellii*), Huico Yucateco (*Aspidoscelis angusticeps*), Ts'lim Chaay (*Cnidocolus souzae*), Uvero (*Coccoloba ortizii*), Cheet, náaj k'aax (*Coccothrinax readii*), Cuija yucateca (*Coleonyx elegans*), Siricote (*Cordia dodecandra*), Xikin Burro (*Croton chichenensis*), Xikin Ch' Omak (*Croton peraeuginosus*), Mocashane (*Cuphea gaumeri*), Chara yucateca (*Cyanocorax yucatanicus*), Zapotillo (*Diospyros cuneata*), Culebra caracolera chata (*Dipsas brevifacies*), Eslizón (*Mesoscincus schwartzei*), Bolín yucateco (*Floridichthys polyommus*), Cajum kij (*Furcraea cahum*), Cachorrito de Progreso (*Jordanella pulchra*), Boox kibche' (*Guettarda gaumeri*), Chukum (*Havardia albicans*), Ratón espinoso yucateco (*Heteromys gaumeri*), Kabal-k'aak (*Hintonia octomera*), Calandria dorso naranja (*Icterus auratus*), Culebra cordelilla yucateca (*Imantodes tenuissimus*), Sapo Jaspeado, Sapo Marmoleado (*Incilius marmoreus*), Piñón, Pomolché (*Jatropha gaumeri*), Tortuga Pecho Quebrado de Craser (*Kinosternon creaseri*), Culebra ojo de gato de selva (*Leptodeira frenata*), K'an xu'ul (*Lonchocarpus xuul*), Ya'Ax Xu'UI (*Lonchocarpus yucatanensis*), Flores de mayo (*Mateleia belizensis*), Contrahierba (*Mateleia campechiana*), Carpintero yucateco (*Melanerpes pygmaeus*),



Maullador negro (*Melanoptila glabrirostris*), Guajolote ocelado (*Meleagris ocellata*), Papamoscas yucateco (*Myiarchus yucatanensis*), Pinta ña, ta?tsi, ramón negro (*Neea choriophylla*), Sak Its?A (*Neomillspaughia emarginata*), Ratón yucateco (*Peromyscus yucatanicus*), Sak Ts?Its?Ilche?, Limonché (*Samyda yucatanensis*), Ardilla yucateca (*Sciurus yucatanensis*), Cucharita de río (*Gobiesox fluviatilis*), Tapacamino Yucateco (*Antrostomus badius*), Euphorbia (*Argythamnia wheeleri*), (*Myrmecophila christinae*), Xkaax (*Randia longiloba*), Lagartija escamosa pintas amarillas (*Sceloporus chrysostictus*), Lagartija espinosa de Cozumel (*Sceloporus cozumelae*), Lagartija espinosa yucateca (*Sceloporus lundelli*), Ardilla yucateca (*Sciurus yucatanensis*), (*Talisia oliviformis*), Rana cabeza de casco (*Tripriion petasatus*), Saltapared vientre blanco (*Uropsila leucogastra*)

Tasa de Transformación de las Cubiertas Forestales del ANP:

| Periodo | Tasa de Transformación (%) | Hectáreas por Año | Valoración de Tasa | Año de Reporte |
|-----------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 2000-2008 | 0.01 | 64 | Pérdida | 2009 |
| 1976-2000 | 0.019 | 88 | Ganancia | 2003 |